
ANAIS 15^a. JOBA - FÓRUM CIENTÍFICO PROJETO ACADÊMICO

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE COR EM ÍRIS DE PRÓTESES OCULARES

COLOR STABILITY ASSESSMENT IN PROSTHESIS IRIS EYE

Trinchão, Mariana Pereira¹; Lira, Andréa Fabiana de²; Meyer, Guilherme Andrade²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A íris artificial é a estrutura da prótese ocular responsável pela sua naturalidade e estética. O aperfeiçoamento das técnicas já estipuladas e a difusão dos conhecimentos inerentes a esses procedimentos e sua longevidade, são uma busca constante, justificadas pelo aumento dos defeitos craniofaciais traumáticos ou resultados de cirurgias oncológicas. A cor das próteses faciais correspondentes à íris e a esclera, desafiam os reabilitadores mesmo com materiais e métodos já documentados na literatura corrente. Para obtenção da cor da íris, as técnicas mais utilizadas são pintura e impressão fotográfica, mas ambas, ainda apresentam vida útil questionável. Dessa maneira, este trabalho objetiva avaliar a estabilidade visual da cor marrom nas técnicas de confecção de íris em que será aplicado o método de secagem, utilizando secagem natural e com luz infra vermelha. Para este estudo, serão confeccionados 40 discos com resina acrílica termopolimerizável nº 1 da Clássico para prótese ocular. A amostra será dividida em G1: 20 corpos de prova para pintura manual à base de tinta a óleo e G2: 20 amostras através do método fotográfico, digitalizado em programa Adobe Photoshop 7.0 e impressão em papel fotográfico. Após submissão desses tratamentos nas amostras, é esperada a estabilidade de cor em ambas as amostras, em diferentes tempos.

Palavras-chaves: Prótese; pigmentação; cor de olho; prótese maxilofacial.

Keywords: Prosthesis; pigmentation; eye color; maxillofacial prosthesis.

ADAPTAÇÃO MARGINAL DE COROAS PROVISÓRIAS CONFECCIONADAS PELA TÉCNICA DE MOLDAGEM PRÉVIA

MARGINAL ADAPTATION OF TEMPORARY CROWNS FABRICATED BY THE FIRST IMPRESSION TECHNIQUE

Badaró, Amanda Andrade¹; Lima, Emilena Maria Castor Xisto²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

A confecção da prótese provisória é uma etapa essencial para um bom tratamento protético por ser responsável pela saúde gengival e pulpar, evitar o deslocamento dental, restabelecer a oclusão e servir como base para a confecção da prótese final. Uma boa adaptação marginal da prótese provisória é requisito fundamental para que a mesma cumpra suas funções, sendo importante a escolha da técnica de confecção, material de moldagem e material provisório. O objetivo deste trabalho será avaliar o grau de adaptação marginal de coroas provisórias em resina confeccionadas pela técnica da moldagem prévia. Serão confeccionados 144 corpos de prova distribuídos em três grupos (molde em alginato, molde em silicona de condensação e matriz de plástico). Cada grupo será dividido em quatro subgrupos de acordo com o tipo de resina utilizada (Duralay, Alike, Voco e Protemp) (n=12). Os moldes serão confeccionados com 3 materiais distintos: alginato, silicona de condensação e placa de vinil. As resinas testadas serão inseridas no molde/matriz e adaptadas no padrão em metal, cópia de um molar inferior preparado para coroa total metalocerâmica. Para leitura da discrepância marginal, os corpos de prova serão posicionados no padrão em metal e avaliados na lupa estereoscópica com aumento de 100x nas faces vestibular, lingual, mesial e distal. As imagens obtidas serão transferidas para o programa Corel Draw X7 e a distância da margem cervical da restauração até o término cervical do padrão será mensurada. Serão realizadas três leituras em cada face e as medidas serão tabuladas e submetidas aos testes estatísticos adequados.

Palavras-chaves: Prótese; Moldagem; Marginal.

Keywords: Prosthesis; Impression; Marginal.

AGENESIA FORA DA REGIÃO ACOMETIDA PELA FISSURA LABIAL E/OU PALATINA NÃO-SINDRÔMICA

AGENESIS OUT OF THE REGION WITH CLEFT LIP AND PALATE NO-SYNDROMIC

Araújo, Luana Lima Gonçalves¹; Sá, Jamile de Oliveira²; Guimarães, Laís Bastos¹; Sane, Camila³; Mariano, Lorena Castro³; Reis, Silvia Regina de Almeida⁴

1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora adjunta da Faculdade Ruy Barbosa (FRB); Professora adjunta da Faculdade Maria Milza (FAMAM)
3. Mestrandas em Estomatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
4. Professora adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

As fissuras de lábio e/ou palato (FL/P) compreendem significantes defeitos congênitos nos seres humanos e estão entre as malformações mais frequentes na região craniofacial. As anomalias dentárias quanto ao número, são as mais identificadas em indivíduos com fissura labiopalatina não-sindrômica (FL/PNS). A agenesia é de cinco a sete vezes mais frequente em indivíduos com fissuras labiopalatinas comparados à população sem alterações morfofuncionais. A literatura relata uma alta frequência de agenesia de um ou mais dentes permanentes fora da área da fissura, em particular dos segundos pré-molares superiores. Por se tratar de anomalias comuns e dada a importância do seu diagnóstico, visto que acarretam problemas estéticos e funcionais, o objetivo desse trabalho é determinar a prevalência de agenesia dentária fora da região acometida pela fissura em indivíduos com FL/PNS atendidos em um centro de referência em fissuras orofaciais no estado da Bahia. Para este estudo serão revistos prontuários de pacientes atendidos no Centro de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais da Associação Obras Sociais Irmã Dulce – Centrinho e selecionados indivíduos que preencham os seguintes critérios: apresentar fissura de lábio e/ou palato não-sindrômica, possuir radiografia panorâmica, odontograma e histórico odontológico em seu prontuário. Foram excluídos da amostra pacientes com história prévia de extração dental, que foram submetidos a tratamento ortodôntico e aqueles com idade inferior a 12 anos.

Palavras-chaves: Diagnóstico, Patologia bucal, anormalidades congênitas
keywords: Diagnosis, Pathology oral, Congenital Abnormalities

AGENSESIA EM INDIVÍDUOS COM FISSURA LABIAL E/OU PALATINA NÃO SINDRÔMICA

AGENESIS IN INDIVIDUALS WITH CLEFT LIP AND/OR CLEFT PALATE NOT SYNDROMIC

Guimarães, Laís Bastos¹; Araújo, Luana Lima Gonçalves¹; Sá, Jamile de Oliveira²; Medrado, Alena Peixoto³; Veiga, Patrícia de Castro³; Reis, Silvia Regina de Almeida³.

1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Mestre Profissionalizante em Estomatologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor Titular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A ausência congênita de dentes é a anormalidade de desenvolvimento mais comum na população humana. Há consenso na literatura de que o primeiro grupo de dentes mais acometido pela agenesia corresponde aos terceiros molares. O segundo tipo mais acometido varia entre os segundos pré-molares inferiores e os incisivos laterais superiores, sendo comum a agenesia de um ou dois dentes. As fissuras de lábio e/ou palato (FL/P) compreendem um significativo componente de defeito congênito humano e estão entre as malformações mais frequentes na região craniofacial. Estudos sugerem que aproximadamente 70% dos casos de FL/P ocorrem de forma não-sindrômica (FL/PNS) ou seja, isolada sem malformações ou alterações adicionais. Os indivíduos acometidos pela FL/PNS apresentam características específicas desde a dentição decídua e, entre as particularidades odontológicas mais comuns encontram-se as alterações dentárias morfológicas e funcionais nas regiões das fissuras e fora delas cuja gravidade parece estar diretamente relacionada ao tipo de fissura. As anomalias dentárias mais frequentes em indivíduos com FL/PNS correspondem às malformações de número e de tamanho dos dentes. Este trabalho tem como objetivo determinar a prevalência de agenesia dentária em indivíduos com FL/PNS atendidos em um centro de referência em fissuras orofaciais no estado da Bahia. Para este estudo serão revistos prontuários de pacientes atendidos no Centro de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais da Associação Obras Sociais Irmã Dulce–Centrinho e selecionados indivíduos que preencham os seguintes critérios: apresentar fissura de lábio e/ou palato não sindrômica, possuir radiografia panorâmica, odontograma e histórico odontológico em seu prontuário.

Palavras-chaves: Anormalidades do Sistema Estomatognático; Patologia bucal; Prevalência.

Keywords: *Stomatognathic System Abnormalities; Pathology, oral; Prevalence.*

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE LEIGOS, ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUANTO A ALTERAÇÕES ESTÉTICAS DO SORRISO

ASSESSMENT PERCEPTION OF LAYPERSONS, STUDENTS AND DENTAL PROFESSIONALS AS THE ESTHETIC SMILE CHANGES

Souza Júnior, Luiz Roberto Soares¹; Souza, Ítala Sued Carneiro ¹; Cerqueira, Filipe
Fortaleza²; Bastos, Luiz Gustavo Cavalcanti³

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Aluno do Curso do Mestrado Profissional em Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A estética dentária constitui um dos principais critérios a ser avaliado por diferentes grupos populacionais. Devido à subjetividade, as características intrínsecas são modificadas durante o plano de tratamento e estudos são necessários para a sua melhor padronização. Desta forma, esta pesquisa pretende avaliar a percepção de leigos, estudantes e profissionais de Odontologia quanto às alterações estéticas do sorriso envolvendo 30 leigos, 30 profissionais de Odontologia e 30 estudantes de graduação de Odontologia em formação. A coleta dos dados será realizada através do preenchimento de questionário específico e avaliação de uma escala visual análoga, através de um álbum contendo 13 fotografias, sendo 12 destas alteradas intencionalmente de forma incremental através do programa Adobe Photoshop CC, apresentando 6 alterações estéticas: recessão gengival, diastema, exposição gengival ao sorriso, exposição da cinta metálica numa coroa metalocerâmica, desvio de linha média e alteração de cor dentária em dois diferentes incrementos cada. Ao final, espera-se verificar e quantificar os critérios estéticos encontrados após a avaliação das fotografias apresentadas e os valores atribuídos através da escala, comparando os diferentes grupos de alunos em formação com os leigos e profissionais de Odontologia, além de analisar a grade curricular na formação destes estudantes a partir dos resultados encontrados.

Palavras-chaves: Sorriso; Estética Dentária; Expressão Facial

keywords: Smile; Dental Aesthetics; Facial Expression

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DEFEITOS FACIAIS ATENDIDOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

PATIENTS LIFE QUALITY EVALUTION WITH FACIAL DEFECTS TREATED IN HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

SOUSA, Taíse Costa de Oliveira¹; GIAMPÁ, Márcio Ticianeli²; MEYER, Guilherme Andrade³.

1. Graduanda do curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Segundo a (OMS), “Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Desta forma, uma vez que essa qualidade é afetada, sentimentos negativos irão comprometer tanto o estado de saúde física e mental, quanto o resultado do tratamento da enfermidade. Esta avaliação em pacientes oncológicos da cabeça da cabeça e pescoço, supõe dados que auxiliam em decisões clínicas, identificam os grupos de risco e providenciam informações preditivas de prognóstico, aprimorando assim os Serviços de Saúde. Diante disso, o presente projeto tem como objetivo avaliar pacientes com defeitos faciais atendidos no Hospital Aristides Maltez (Salvador-Bahia), visando compreender como as mutilações faciais influenciam na qualidade de vida dos indivíduos, bem como interferem na saúde de modo geral, despertando, assim, a atenção dos profissionais de saúde para um maior cuidado e atenção com estes pacientes. Serão selecionados de forma aleatória pacientes que foram submetidos a cirurgias de ressecção tumoral na região de face, sem predileção quanto ao gênero, raça ou idade, no período de 2015 a 2017. Mediante consentimento, será realizada uma análise de prontuário, entrevista e preenchimento do questionário EORTC QLQ-H&N35, dando ênfase as questões de condições de saúde e psicossociais. As evidências epidemiológicas obtidas nessa pesquisa, poderão proporcionar mudanças nos protocolos de suporte multiprofissional de forma mais efetiva, favorecendo a análise do impacto da doença e seu tratamento, tornando assim uma estratégia de gestão de saúde.

Palavras-chave: Qualidade de vida. Saúde. Pacientes.

Key-words: Quality of life. Cheers. Patients.

AVALIAÇÃO DA VITAMINA D EM PACIENTES COM SÍNDROME METABÓLICA E DOENÇA PERIODONTAL

EVALUATION OF VITAMIN D IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROM AND PERIODONTAL DISEASE

Souza, Humberto Lucas Bastos de¹; Silva, Maria de Lourdes de Souza²; Tunes, Urbino da Rocha³; Tunes, Roberta Santos².

1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor Titular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A Síndrome Metabólica (SM) é uma desordem complexa em que alterações metabólicas se manifestam simultaneamente, constituindo os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus. Devido ao fato de tanto a Doença Periodontal (DP) como a SM estarem associadas a um estado inflamatório sistêmico subclínico e à resistência insulínica, ambas devem apresentar um caminho etiopatogênico em comum, influenciando-se mutuamente, na medida em que as condições sistêmicas podem modular a resposta inflamatória no periodonto. A vitamina D, conhecida pela sua relação com o tecido ósseo e com a homeostase do cálcio e fósforo, caracteriza-se também pela influência em processos fisiológicos endocrinometabólicos. O atual trabalho objetiva avaliar a Vitamina D de pacientes com síndrome metabólica e doença periodontal, verificando-a ou não como um fator agravante na inter-relação destas patologias. A amostra será composta por pacientes do ambulatório de obesidade da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, que após avaliação física e laboratorial, serão enquadrados em três grupos metabólicos: Grupo 1: Pacientes diagnosticados com SM; Grupo 2: Pacientes sem SM; Grupo 3: Pacientes saudáveis (controle). Por fim, serão submetidos ao exame periodontal, sendo classificados com ou sem periodontite crônica moderada ou severa. A vitamina D, a partir dos níveis plasmáticos de 25(OH)D, será dosada pelo método ELISA. Espera-se encontrar maior severidade e extensão dos parâmetros clínicos periodontais, nos pacientes com síndrome metabólica, e além disso avaliar os níveis de Vitamina D, identificando-a ou não como contribuinte para a inter-relação entre estas patologias.

Palavras-chaves: síndrome metabólica, doença periodontal, vitamina D.

Keywords: *Metabolic syndrome, periodontitis, vitamin D*

DOENÇAS PERI-IMPLANTARES: PREVALÊNCIA E POSSÍVEIS INDICADORES DE RISCO

PERI-IMPLANT DISEASES: PREVALENCE AND POSSIBLE RISK INDICATORS

Souza, Ítala Sued Carneiro¹; Tunes, Roberta Santos²; Tunes, Urbino da Rocha Tunes³

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor titular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A peri-implantite é a maior responsável pela perda de implantes dentários. Por isso, este projeto tem como objetivos avaliar a prevalência de doenças peri-implantares em pacientes parcialmente edêntulos, reabilitados com prótese sobre implantes, e a influência de possíveis indicadores de risco á essas doenças. Trata-se de um estudo observacional transversal, com usuários de próteses implanto-suportadas, com carga superior a um ano. Os sujeitos serão avaliados por meio de questionário, envolvendo aspectos sócio demográficos, história médica-odontológica, hábitos de higiene oral, terapia de suporte e manutenção periimplantar. Além disso, serão realizados exames físicos gerais como medidas antropométricas e intra-bucal, avaliando parâmetros clínicos como índice de placa visível, sangramento à sondagem (SS), profundidade de sondagem (PS), quantidade de mucosa ceratinizada e grau de mobilidade. Aqueles que apresentarem (PS) < 5,0mm, com ausência de (SS) serão classificados portadores de saúde peri-implantar, e mucosite peri-implantar os que apresentarem (PS) < 5,0mm, com presença (SS) sem perda óssea patológica. Indivíduo com (PS) ≥ 5,0 mm, associado a 2,0 mm de perda óssea peri-implantar, com presença ou não de supuração, e/ou mobilidade, serão classificados portadores de peri-impantite. Espera-se encontrar maior prevalência para mucosite quando comparada a peri-implantite, relacionados aos indicadores de risco.

Palavras-chaves: *Peri-implantite, Mucosite, Indicador de Risco*

keywords: *Peri-Implantitis, Stomatitis, Risk Index*

EXAMES PERIODONTAIS E PERI-IMPLANTARES REALIZADOS POR CIRURGIÕES-DENTISTAS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT EXAMINATIONS BY DENTISTS FROM COITÉ OF CONCEPTION

Araújo, Kirlian Minely Queiroz de¹; Barbosa, Mônica Dourado Silva²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e Doutora em Periodontia

A prática clínica diária do Cirurgião-Dentista envolve inúmeras decisões que devem ser tomadas observando a categoria da doença que esteja mais aproximada com o estado clínico do paciente. Essas decisões estão relacionadas ao diagnóstico e ao plano de tratamento dos pacientes aos quais presta atendimento. O processo de diagnóstico é realizado rotineiramente, desde diferenciar processos de saúde de doença, até determinar o estágio/severidade da doença para poder escolher a melhor alternativa de terapia e determinar de maneira a mais acurada possível o prognóstico para o caso. Desta forma, conhecer as alterações periodontais e Peri-implantares é fundamental para reconhecê-las e direcionar o paciente para o tratamento adequado. O objetivo do presente estudo é, avaliar, por meio de questionário, qual o perfil dos Cirurgiões-Dentistas da cidade de Conceição do Coité que realizam procedimentos de exame e diagnóstico da doença periodontal e Periimplantar, observando-se como este exame é realizado. O tipo de estudo realizado é o de corte transversal, baseado em um questionário aplicado a todos os Cirurgiões-Dentistas da cidade de Conceição do Coité que trabalham em consultórios particulares, com um total de 32 Cirurgiões-Dentistas registrados no Conselho Federal de Odontologia (CFO). Espera-se com o resultado dessa pesquisa que todos ou pelo menos a maioria dos Cirurgiões - Dentistas da cidade de Conceição do Coité realize algum tipo de exame Periodontal e Peri-implantar do paciente, embora exames mais completos e específicos sejam realizados em sua maioria por especialistas da área.

Palavras-chave: Doença Periodontal, Diagnóstico, Questionário.

Keywords: *Periodontal Disease, Diagnosis, Quiz.*

**PORPHYROMONAS GINGIVALIS:
CULTIVO; OBTENÇÃO DO EXTRATO E DE FRAÇÕES ANTIGÊNICAS**

**PORPHYROMONAS GINGIVALIS:
CULTIVATION; OBTAINING THE EXTRACT AND THE ANTIGENIC
FRACTIONS**

Souza, Isabela Neme Sá¹, Ellen Karla Nobre dos Santos⁴; Bittencourt, Brenda Felix¹; de Carvalho Filho, Paulo Cirino³; Trindade, Soraya Castro⁵; Xavier, Márcia Tosta²

1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
3. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
4. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Imunologia da Universidade Federal da Bahia
5. Professora Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana

A doença periodontal é multifatorial, caracterizada como um processo infeccioso que pode levar à destruição dos tecidos de sustentação dos dentes. A etiologia bacteriana na periodontite é caracterizada pela presença de microrganismos gram-negativos, tais como *Porphyromonas gingivalis* (*Pg*), *Tannerella forsythia* e *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. A patogenicidade desta doença é mediada pela resposta imune do hospedeiro. Estudos apontam que *Pg* é um patógeno chave na periodontite. Estudar seus fatores de virulência pode levar ao melhor entendimento na patogênese da doença. O presente estudo objetiva o cultivo de *Pg* ATCC 33277, obtenção do extrato total, fracionamento e avaliação da antigenicidade das frações obtidas. O projeto foi aprovado pelo sistema CEP/CONEP (CAAE: 33105914.2.3001.0053). Os participantes foram selecionados pela avaliação clínica, utilizando descritores periodontais e divididos em dois grupos. O sangue foi coletado por punção venosa e o soro obtido por centrifugação foi congelado à -20°C. Foram obtidas, até o momento, amostras de 34 pacientes, 17 com periodontite crônica e 17 sem periodontite, sendo 27 mulheres e 7 homens. As amostras de *Pg* foram ativadas em placas Agar-Sangue, transferidas para meio Caldo Base Brucella suplementado com hemina. As células serão centrifugadas, lavadas e submetidas ao rompimento por ultra-som em presença de inibidores de proteases. Após o rompimento das células, o extrato será fracionado por cromatografia em FPLC e a antigenicidade das frações será testada pela técnica de ELISA usando os soros dos participantes. Espera-se encontrar reações positivas do soro dos pacientes às frações que serão, então, utilizadas em estudos de resposta celular à periodontite crônica.

Palavras-chaves: Doença periodontal; *Porphyromonas gingivalis*; Resposta imune

Keywords: Periodontal disease; *Porphyromonas gingivalis*; Immune response

PROCEDIMENTOS DE EXAME E DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PERIODONTAIS E PERI-IMPLANTARES REALIZADOS POR CIRURGIÕES DENTISTAS DA CIDADE DE SALVADOR

EXAMINATION PROCEDURES AND DIAGNOSIS OF PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT DISEASE PERFORMED BY DENTISTS FROM SALVADOR CITY

Souza, Caroline Souza¹; Barbosa, Mônica Dourado Silva²

1. Discente do curso de odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

As doenças periodontais e periimplantares, são doenças infecciosas que acometem o periodonto tanto de proteção (gingiva) como de sustentação (osso, ligamento periodontal e cimento), caso não tratadas e identificadas precocemente podem resultar em perda dentária ou do implante. As doenças periodontais mais comuns são a gengivite e a periodontite, a periimplantares temos a mucosite e a periimplantite. Porém, o cuidado de um exame criterioso e um diagnóstico preciso, podem ser decisivos para um bom plano de tratamento e prognóstico. O cirurgião-dentista, independentemente de sua especialidade de atuação, pode estar capacitado a executar estes procedimentos, mesmo que não seja responsável pelo tratamento das alterações eventualmente encontradas. O presente estudo tem como objetivo fazer um levantamento de procedimentos de exame e diagnóstico da doença periodontal e periimplantar, por meio de aplicação de questionários para cirurgiões-dentistas atuantes na região metropolitana da cidade de Salvador. Será feito um levantamento dos exames periodontais e periimplantares mais utilizados pelo cirurgião-dentista, avaliando-se a possível diferença entre especialidades odontológicas em relação à frequência e aos critérios de realização do diagnóstico periodontal e periimplantar.

Palavras-chaves: doenças periodontais, exame bucal, diagnóstico.

TRAUMATISMO DENTO-ALVEOLAR EM ESCOLARES DE UMA ONG EM SALVADOR-BA: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA

TRAUMA DENTO -ALVEOLAR IN STUDENT AN NGO IN SALVADOR -BA : AN EPIDEMIOLOGICAL APPROACH

Garcia, Carolina Silva Cervino¹; Almeida, Tatiana Frederico².

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O traumatismo dentoalveolar tem sido descrito em vários locais do mundo com alta prevalência na dentição decídua, com cerca de um terço das crianças sendo afetadas. Essa pesquisa é de caráter epidemiológico cujo desenho é o de corte transversal e tem como objetivo descrever a prevalência e gravidade de traumatismo dento-alveolar em crianças e jovens de 03 a 18 anos, através de um estudo epidemiológico em uma ONG. Será realizado no CEIFAR (Centro de Integração Familiar) situada no bairro de Tancredo Neves em Salvador-BA, que atende cerca de 400 crianças e jovens de 03 a 18 anos, os quais cursam a Educação Infantil (crianças de 03 a 05 anos) e atividades extra-curriculares (capoeira, futsal, música, karatê; crianças de 06 a 18anos). O exame será realizado e anotado em uma ficha específica para cada criança, onde serão registradas todas as informações pessoais, sociodemográficas e história do trauma, cumprindo um mesmo protocolo para todos os pacientes. Os dados referentes ao trauma seguirão os mesmos critérios do SB Brasil 2010. Espera-se obter resultados sobre a Descrição epidemiológica do traumatismo dento-alveolar em crianças e jovens desta instituição, quanto a prevalência, gravidade, localização, principais fatores etiológicos e potenciais fatores associados ao mesmo. Portanto, essa pesquisa é de grande importância para que haja uma divulgação de informações de prevenção deste problema de saúde bucal para a comunidade, como por exemplo, melhoria dos cuidados com as crianças no ambiente familiar e escolar, assim como nas atividades esportivas desenvolvidas nesta ONG.

Palavras-chaves: Traumatismos dentários, criança, adolescente.

Keywords: Tooth Injuries, child, Adolescent.