
ANAIS 15^a. JOBA - FÓRUM CLÍNICO ACADÊMICO

ALTERNATIVA NA REABILITAÇÃO DENTÁRIA POSTERIOR DA MANDÍBULA

ALTERNATIVE IN REHABILITATION OF DENTAL JAW REAR

Gomes, Sarah Evangelista Silva; Marchionni, Antonio Marcio Teixeira

10. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

11. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A reabilitação de mandíbulas atroficas com implantes é uma demanda real na odontologia, a literatura mostra relata algumas técnicas amplamente utilizadas, como a utilização de enxertos ósseos, distração osteogênica, lateralização do nervo alveolar inferior e implantes curtos, no entanto esses procedimentos trazem maior morbidade, custo e riscos de lesão ao nervo alveolar inferior, podendo levar a parestesia temporária ou permanente. Esse trabalho tem como objetivo evidenciar a existência de uma técnica (através de um relato de caso) que oferece maiores vantagens quando comparada com as outras técnicas antes citadas, a lateralização dos implantes. Paciente gênero feminino, 65 anos, ASA I, chegou a EBMSp com ausência dos dentes inferiores posteriores bilateral, grande reabsorção óssea com nervo alveolar superficializado. Tinha como principal interesse a realização de implantes para reabilitar as unidades ausentes. Foi planejada previamente uma cirurgia de enxertia óssea para essas regiões. Seis meses após a cirurgia foi constatado um aumento em altura vertical posterior insuficiente, no entanto a paciente apresentava dimensão horizontal adequada para a instalação de implantes laterais. Comparada a outras técnicas na literatura, já citadas anteriormente, a lateralização do implante mostrou menor risco de lesão ao nervo alveolar inferior, menor morbidade e custo para o paciente, além de oferecer sustentação bicortical, favorecendo a estabilidade do implante. No entanto ela depende muito da habilidade do cirurgião dentista.

Palavras chave: Enxerto; Implantes dentários; Distração.

Keywords: *Grafting; dental implants; Distraction.*

AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO

AMELOBLASTOMA UNICYSTIC

Almeida, Thamires Tambuque de; Cerqueira, Arlei

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Os ameloblastomas unicísticos são tumores odontogênicos benignos que apresentam particularidades como comportamento menos agressivo que o ameloblastoma comum e um baixo índice de recidiva. Acomete, principalmente, indivíduos jovens. As formas de tratamento variam de acordo com as características da lesão, como a velocidade de crescimento, podendo ser conservadoras ou radicais. Paciente do gênero masculino, 63 anos, compareceu ao atendimento com queixa de aumento de volume assintomático em ângulo da mandíbula. Ao exame radiográfico, observou-se área radiolúcida multilocular, havendo também expansão e perfuração das corticais. No momento da biópsia incisional, foi realizado a marsupialização. No período de acompanhamento, diante do diagnóstico de ameloblastoma unicístico, a cirurgia teve que ser adiada por cerca de 12 meses por problemas conjunturais, sendo feito controles trimestrais por meio de radiografia panorâmica. Inicialmente, observou-se a redução do volume da lesão, mas, em seguida, o tumor voltou a progredir rapidamente e, então, procedeu-se a ressecção cirúrgica e reconstrução imediata com enxerto livre da costela. Embora o Ameloblastoma Unicístico seja uma lesão de aspecto cístico, fica evidente sua característica neoplásica uma vez que não responde à descompressão.

Palavras-chaves: Ameloblastoma, mandíbula, tumores odontogênicos.

Keywords: *Ameloblastoma, mandible, odontogenic tumors.*

COMUNICAÇÃO OROANTRAL DECORRENTE DE EXTRAÇÕES DENTÁRIAS – RELATO DE CASO

OROANTRAL FISTULA ARISING OUT OF TEETH EXTRACTION – CASE REPORT

Martins, Lara Couto; Daltro, Rafael Moreira; Oliveira, Cleidiana Celi Bomfim; Ribeiro,
Mariana Pina Azevedo; Mascarenhas, Bruno Araújo; Assis, Adriano Freitas.

12. Estudante do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
13. Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (USP) | Professor Adjunto do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);

O seio maxilar é uma estrutura interna ao osso da maxila que faz comunicação com as vias aéreas do corpo humano. Essa cavidade é constituída por seis paredes: a anterior, a lateral, a medial, o teto e o soalho; apresentando, por esta última, íntima relação de proximidade com as raízes dos dentes superiores posteriores. Devido a essa íntima relação, é possível que em algumas extrações haja o rompimento do soalho do seio maxilar, dando origem às chamadas comunicações bucossinusais ou oroantrais. Essa complicação cirúrgica permite o cruzamento de bactérias bucais para a cavidade sinusal, trazendo risco ao paciente de desenvolver uma sinusite e formação de fístulas. A fim de evitar estes agravos, notou-se a importância de um tratamento imediato. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico, o qual o paciente apresentou como consequência de uma exodontia da unidade 1.6, uma comunicação oroantral. Foi diagnosticado por meio de exame radiográfico e da Manobra de Valsalva, e seu tratamento foi mediante a técnica do retalho vestibular. Em virtude do cenário propício à essa intercorrência, é importante que o cirurgião dentista tenha conhecimento desse acidente e saiba como se proceder frente à esse tipo situação no cotidiano clínico.

Palavras-chaves: Cirurgia bucal; Seio maxilar; Complicações intraoperatórias.

Keywords: Surgery, oral; maxillary sinus; Intraoperative complications.

HARMONIZAÇÃO DO SORRISO COM FACETAS LAMINADAS DE PORCELANA: RELATO DE CASO

SMILE HARMONIZATION WITH PORCELAIN LAMINATE VENEERS: CASE REPORT

Alves, Tatiane Cristina Magalhães; Cavalcanti, Andréa Nóbrega; Lima, Emilena Maria
Castor Xisto

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Os avanços na Odontologia estética e a grande influência da mídia proporcionaram uma busca insistente pelo sorriso perfeito. Um sorriso equilibrado influencia tanto no psicológico do paciente, como no convívio social. As facetas laminadas de porcelana são métodos estéticos altamente indicados para reestabelecer a harmonia do sorriso, proporcionando um recobrimento da face vestibular com um material restaurador. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de caso clínico, com o uso de facetas laminadas de porcelana como opção de tratamento para a reabilitação oral. A paciente R.M.A, procurou atendimento odontológico com queixa de descontentamento com as resinas compostas usadas para fechar os espaços entre os dentes. Foi elaborado um plano de tratamento para a reabilitação estética, com a execução de facetas laminadas de porcelana nas unidades 11, 12, 21 e 22, que apresentavam restauração de resina composta na face mesial. O sistema cerâmico de escolha foi o IPS e.Max, composto à base de dissilicato de Lítio, com substrato de média translucidez, na cor A1. Realizou-se o planejamento digital do sorriso e enceramento diagnóstico do caso. Os preparos realizados nesse caso foram minimamente invasivos, já que a paciente não apresentava alterações significantes de cor e forma das estruturas dentais. Pode-se afirmar que, para o sucesso clínico e longevidade da faceta, é imprescindível um bom planejamento e uma boa comunicação com o protético. Ao final do tratamento, foi possível observar um sorriso harmônico e com resultato estético altamente satisfatório para a paciente e toda a equipe

Palavras-chave: Cerâmica; Facetas Dentárias; Reabilitação oral.

Keywords: Ceramics; Dental Veneers; Oral Rehabilitation.

INCISIVOS PERMANENTES IMPACTADOS ASSOCIADOS À PRESENÇA DE ODONTOMA COMPOSTO

IMPACTED PERMANENT INCISORS ASSOCIATED WITH COMPOUND ODONTOMA

Barnabé, Andresa; Rodrigues, Kelvyn; Oliveira, Hanna Priscila de; Gomes, Assíria; Knop, Luégya; Machado, Cíntia.

1. Alunos do curso de Odontologia da UNIME – Salvador
2. Professora da UNIME - Salvador

Odontomas são os tumores odontogênicos mais comuns dos maxilares, caracterizados por um crescimento lento e comportamento benigno. Eles são geralmente pequenos, assintomáticos e diagnosticados após exame radiográfico de rotina. O objetivo deste estudo foi relatar um caso de um odontoma composto na região anterior da maxila de uma menina de sete anos de idade, o qual estava causando a impação dos incisivos central e lateral superiores direitos, bem como a retenção prolongada dos dentes decíduos correspondentes. Ressaltamos a relevância do presente estudo, uma vez que não faz parte do dia-a-dia do cirurgião-dentista na prática clínica. As características clínicas e radiográficas, o diagnóstico e o tratamento deste caso serão discutidos neste estudo.

Palavras-chaves: Tumores odontogênicos; Odontoma; Odontopediatria

Keywords: Odontogenic tumours; Odontoma; Pediatric Dentistry

PLANEJAMENTO REVERSO EM PRÓTESE PARCIAL FIXA SOBRE IMPLANTE

TREATMENT PLANNING IN PARTIAL PROTHESES ON IMPLANT

Oliveira, Fernanda Vita Argolo; Giampá, Priscila Couy Corrêa; Ticianeli, Márcio Giampá

1. Graduanda do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)
2. Mestranda em Clínica Odontológica da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)
3. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

Os tratamentos com a utilização de implantes osseointegrados têm sido cada vez mais empregados na odontologia atual, seja para reabilitações unitárias, parciais ou totais. O correto diagnóstico e planejamento dos casos levam a um resultado final esteticamente adequado e satisfatório. O planejamento reverso em tratamentos reabilitadores é de extrema importância, pois o mesmo elimina os fatores que possam comprometer a função e a estética das futuras próteses implantossuportadas, otimizando o resultado final. Portanto, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente reabilitado através da instalação de implantes osseointegrados na região posterior da maxila, onde o planejamento reverso foi fundamental para um bom posicionamento tridimensional dos implantes, garantindo o sucesso final do tratamento reabilitador.

Palavras-chaves: Osseointegração; Implante dental; Prótese parcial fixa.

Keywords: *Osseointegration; Dental implantation; Denture partial fixed.*

REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL DE INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES ESCURECIDOS POR TRAUMA

COSMETIC AND FUNCTIONAL REHABILITATION OF CENTRAL UPPER INCISORS DARKENED BY TRAUMA

Oliveira, Camila da Silva; Ticianeli, Márcio Giampá;

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O traumatismo dentário representa um problema de saúde pública entre crianças e adolescentes. Isto se justifica devido a sua alta prevalência reportada em estudos populacionais, seu alto impacto psicossocial e a impossibilidade de se estabelecer programas de prevenção e controle, já que suas causas são variáveis e amplamente conhecidas. Fatores externos como quedas, colisões, acidentes automobilísticos e agressões físicas estão frequentemente associados a traumatismos. O traumatismo dentário pode acarretar as unidades além da perda estrutural, diferentes reações pulpares, como calcificação pulpar, exposição pulpar e necrose pulpar levando a alteração de cor. O objetivo do presente trabalho é descrever, por meio da exposição de um caso clínico, as etapas de uma reabilitação estética e funcional de incisivos centrais superiores escurecido por trauma, baseado na literatura e nas técnicas restauradoras atuais. Nesta condição o clareamento dental pode ser indicado, desde que se tenha noção que é um procedimento limitado. Outra opção de tratamento para se restabelecer a coloração dos dentes e se ter um resultado estético favorável é a confecção de coroas, que podem ou não estar associadas ao clareamento prévio das unidades dentárias em questão. A confecção de coroas com sistemas cerâmicos livres de metal mostra-se como excelente alternativa restauradora, pois possibilita uma estratificação de cores e estrutura de modo mais eficiente. As implicações clínicas do trauma dental são muito relevantes, uma boa anamnese, um bom exame clínico e exames complementares são indispensáveis na instituição de um plano de tratamento adequado. O acompanhamento pósoperatório é de fundamental importância para o prognóstico.

Palavras-chave: Traumatismo dentário, Clareamento dental, Reabilitação.

keywords: Tooth Injuries, Tooth Bleaching, Rehabilitation

REABILITAÇÃO PRÓTETICA SOBRE IMPLANTE APÓS INSUCESSO E PERDA DE IMPLANTE NA MAXILA

PROSTHETIC REAHABILITATION ON IMPLANTS AFTER FAILURE AND LOSS OF IMPLANT IN THE MAXILLA

Mendonça, Jéssica; Bastos, Luiz Gustavo Cavalcanti

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Mestrado e Doutorado em Reabilitação Oral FOB-USP
Professor do Curso de Reabilitação Protética da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Os implantes dentários surgiram como uma opção terapêutica satisfatória para pacientes desdentados que utilizavam próteses totais convencionais e que possuíam intolerância as mesmas. Para que haja maior previsibilidade e sucesso no tratamento reabilitador que dispõe de implantes osseointegráveis, faz-se necessário uma interação multidisciplinar, seja na fase do planejamento, dos procedimentos cirúrgicos e da reabilitação protética. O presente artigo relata a reabilitação protética sobre implante após insucesso e perda de implante na maxila. Uma paciente de 77 anos, do sexo feminino, apresentou-se com queixas de muita dor ao mastigar. No exame físico foi observado uma reabilitação total implantossuportada na arcada maxilar, com sensação dolorosa a função e com mobilidade. Nos exames radiográficos foram evidenciados a presença de dois implantes na região de tuberosidade e dois na região de prémaxila, sendo estes últimos incompatíveis a osseointegração, além de ser observado também volume ósseo insuficiente na região de seio maxilar. Após estudo e correto planejamento, foram realizadas cirurgias para remoção dos implantes, enxerto sinusal bilateral para uma adequada reabilitação com uma nova prótese total fixa sobre implantes.

Palavras-chaves: Implante dentário; Seio maxilar; Prótese dentária; Complicações.

Keywords: *Dental implant; Maxillary sinus; Dental prosthesis; Complications.*

RELATO DE CASO: PROTESE TOTAL OBTURADORA E OVERDENTURE MANDIBULAR COM BARRA CLIPE

CASE REPORT: OBTURATOR PROSTHESIS TOTAL AND OVERDENTURE MANDIBULAR WITH CLIP BAR

Araujo, Luana Lima Gonçalves; Meyer, Guilherme Andrade, Leon, Blanca Liliana; Lira, Andréa Fabiana

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA); Professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

O presente trabalho visa apresentar um caso clínico envolvendo defeito maxilar em paciente edêntulo total, instalação de dois implantes para overdenture em mandíbula e planejamento de barra clipe. Inicialmente foram confeccionadas duas próteses totais com todas as suas etapas bem realizadas até a fase da instalação; seguida do direcionamento dos implantes pela duplicação da prótese inferior para confecção do guia cirúrgico e da cirurgia com instalação de dois implantes paralelos entre si, equidistantes em cerca de 20 cm. Enquanto aguardava a osseointegração, a prótese fora reembasada com material resiliente para evitar cargas e tensões sobre os implantes. Foram moldados os implantes para confecção da barra, com posterior captura dos cliques em boca. Na prótese total maxilar não foi necessária a obturação do defeito em virtude da extensão da própria prótese realizar esta tarefa, sem sobrecargas. Ambas próteses realizaram seu papel com sucesso, devolvendo ao paciente condições de sobrevida mais saudáveis do ponto de vista funcional, mastigatório, estético e fonético. As reabilitações com implantes elevam o prognóstico no quesito retenção e satisfação dos pacientes.

Palavras-chaves: Prótese dentária, Reabilitação bucal, Estética dentária

Keywords: *Dental prosthesis, Mouth rehabilitation, Esthetic dental*

SÍNDROME PARRY ROMBERG: UMA ABORDAGEM CLÍNICA

PARRY ROMBERG SYNDROME: A CLINICAL APPROACH

Pedreira, Jamilli Batista Marchionni Antônio Márcio Teixeira

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A Síndrome de Parry Romberg, também conhecida como a atrofia hemifacial, tem etiologia desconhecida, sendo os fatores patogênicos sugeridos a auto-imunidade, anormalidade do nervo trigêmio, trauma cervicofacial ou infecções. Os sintomas geralmente aparecem na primeira e na segunda década de vida, acometendo mais o sexo feminino. O objetivo deste relato é descrever as características clínicas encontradas em uma paciente de 18 anos de idade portadora da Síndrome Parry Romberg. O diagnóstico foi realizado pelos residentes em cirurgia bucomaxilofacial da EBMS e equipe de neurologia do Hospital Roberto Santos. A Síndrome de Parry Romberg apesar de ser uma doença muito estudada, sua etiologia permanece questionável, sendo sugeridas várias teorias. Porém nenhuma das teorias é aceita universalmente.

Palavras-chave: Atrofia hemifacial; Cirurgia bucal; Odontologia.

Keywords: *Facial hemiatrophy; Surgery, oral; Dentistry.*

TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE CISTO PERIAPICAL INFLAMATÓRIO

INTERDISCIPLINARY TREATMENT OF INFLAMMATORY PERIAPICAL CYST

Rios, Gabriela Santos; Sobreira, Kerllem Alissa Borges; Cerqueira, Lucas Sousa; Júnior, Fernando Bastos Perreira; Dantas, João da Costa Pinto.

1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Residente de Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial
3. Professores Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O cisto periapical inflamatório dentre as patologias odontogênicas possui alta distribuição epidemiológica na população. Acomete geralmente indivíduos do gênero masculino em fase adulta e normalmente uma lesão assintomática, estando comumente localizado nos maxilares. O diagnóstico é realizado através de anamnese detalhada com observações clínicas e exames imaginológico e histopatológico. No exame radiográfico inicial foi evidenciado região radiolúcida, unilocular, circunscrita com bordas finas radiopacas bem definidas e perda da lâmina dura associada ao ápice do dente sem vitalidade(unidade 11). O presente trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico de cisto periapical inflamatório em região anterior de maxila, associado à necrose pulpar da unidade 11. A terapia de escolha foi a remoção cirúrgica, sendo necessário a intervenção endodôntica prévia nas unidades 12 e 13, que independente de responderem com vitalidade, apresentavam seus ápices radiculares em íntimo contato com a cavidade cística. Exames radiográficos periapicais e panorâmico realizados 04 meses após a intervenção cirúrgica evidenciaram indícios de neoformação óssea.

Palavras-chave: Cisto Radicular, Endodontia, Cirurgia Bucal.

Keywords: *Radicular Cyst, Endodontics, Oral Surgery*

TRATAMENTO ORTOCIRÚRGICO EM PACIENTE COM ASSIMETRIA FACIAL

ORTHOSURGICAL TREATMENT IN FACIAL ASYMMETRY PATIENT

Daltro, Rafael Moreira; Lima, Raquel Azevedo Grapiuna; Berenguer, Pedro Pinto; Stevão, Éber Luís de Lima; Azoubel, Maria Cecília Fonseca; Azoubel, Eduardo

1. Estudante do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
2. Especialista em Ortodontia e Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial pela Universidade de São Paulo (USP);
3. Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
4. Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Baylor University Medical Center at Dallas (BUMC);
5. Doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC-CE) | Professora Adjunta do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
6. Mestre em Cirurgia Bucomaxilofacial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

A assimetria facial é uma alteração dentofacial cuja etiologia envolve, geralmente, a hiperplasia condilar. Essa alteração afeta não só a estética do paciente, mas, também, a função do sistema estomatognático; podendo ocasionar mordida cruzada e até disfunções da articulação temporomandibular (ATM). O tratamento da assimetria facial depende do seu grau, podendo ser realizado a partir de tratamento ortodôntico relacionado ou não com cirurgia ortognática. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico sobre um paciente com essa alteração dentofacial que foi corrigida através de tratamento integrado entre ortodontia e cirurgia ortognática associada a cirurgia da ATM. Paciente RMD, 19 anos, sexo masculino, compareceu a clínica particular queixando-se de assimetria facial; ao exame físico, foi possível observar assimetria considerável com hiperplasia condilar do lado direito. O paciente foi classificado como classe II divisão 2 subdivisão direita de Angle e, também, se queixava de dores, bem como estalidos na ATM durante movimento de abertura de boca. O tratamento se deu por compensação ortodôntica; seguida de planejamento virtual e cirurgia ortognática simultânea ao reposicionamento de disco articular; e finalização ortodôntica. As assimetrias faciais são desafios a serem enfrentadas por cirurgiões dentistas, visto que não são alterações fáceis de serem corrigidas; sendo assim, se faz necessário o diálogo entre especialidades para que um plano de tratamento possa ser adotado levando em conta as características particulares de cada caso.

Palavras-chaves: Assimetria facial; Cirurgia ortognática; Ortodontia corretiva.

Keywords: Facial asymmetry; Orthognathic surgery; Orthodontics, corrective.

USO DE ZIRCÔNIA COMO INFRAESTRUTURA EM PRÓTESE TOTAL IMPLANTOSSUPOORTADA: RELATO DE CASO

USE OF ZIRCONIA AS SUBSTRUCTURE ON IMPLANT-SUPPORTED COMPLETE PROSTHESES: CASE REPORT

Mascarenhas, Bruno Araújo; Bastos, Luis Gustavo Cavalcanti

1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Com o intuito de produzir materiais com melhores qualidades mecânicas e estéticas para próteses dentárias, um grande número de novos compostos vem sendo desenvolvido, entre eles a zircônia, material com ótima biocompatibilidade, excelentes propriedades estéticas e mecânicas, apresentando-se como possível alternativa para reabilitação oral. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de reabilitação oral com uso de prótese totalcerâmica implantossuportada com infraestrutura em zircônia. Paciente ADF, 57 anos, apresentava diversas restaurações mal adaptadas, além de fraturas dentárias e protéticas e tratamentos endodônticos deficientes em arcada superior. Abordagem de escolha para reabilitação foi extração de todas as unidades superiores e instalação de prótese total superior implantossuportada com infraestrutura em zircônia e revestimento em cerâmica feldspática, gerando ótimo resultado estético-mecânico e satisfação da paciente. É importante considerar a possibilidade de materiais alternativos às metalocerâmicas para uso em casos com diferentes necessidades estéticas ou mecânicas, por isso são necessários novos estudos e acompanhamentos de casos clínicos de forma a verificar a eficiência de novos materiais e a satisfação dos pacientes submetidos à reabilitações.

Palavras-chaves: Prótese total, materiais dentários, estética.

Keywords: *Complete denture, dental materials, esthetics.*

USO DO MTA PARA TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO: RELATO DE CASO

MTA USE FOR DRILLING TREATMENT: CASE REPORT

Rocha, Lanna; Gomes, Suely Colombo Nelli

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)
2. Professora Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

As perfurações na câmara pulpar são comunicações artificiais entre a cavidade pulpar e os tecidos periodontais, podendo ser de origem iatrogênica ou patológica. Devem ser inteiramente seladas, e o sucesso do tratamento dependerá do tempo decorrido entre a perfuração e o selamento, localização, tamanho da área perfurada e do material selador utilizado. O MTA é o material de escolha, que permite o selamento da comunicação entre os tecidos periodontais e a cavidade pulpar. A apresentação desse caso clínico tem o objetivo de abordar o uso do MTA, demonstrando uma de suas indicações para tratamento de perfuração em câmara pulpar através do relato de caso de uma paciente do gênero feminino, com ampla perfuração na mesial da câmara pulpar da unidade 24. Clinicamente esta unidade apresentava ausência de mobilidade, teste de sensibilidade pulpar e percussão vertical negativo. O exame radiográfico mostrou área radiolúcida extensa compatível com imagem de perfuração e imagem radiolúcida difusa no periodonto lateral próximo a perfuração. O tratamento foi realizado com MTA da marca Angelus®, inserido no local da comunicação permitindo o selamento da área perfurada e neoformação óssea próxima a área da perfuração 90 dias após o selamento. Sendo assim é possível realizar um tratamento conservador mesmo em situações de perfurações extensas, tornando o prognóstico mais favorável.

Palavras-chave: Câmara Pulpar, Canal Radicular, Biomateriais, Endodontia.

Keywords: *Dental Pulp Cavity, Biocompatible Materials, Endodontics.*

RECONSTRUÇÃO CRANIOFACIAL COM A UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA EM METILMETACRILATO: RELATO DE CASO

CRANIOFACIAL RECONSTRUCTION WITH CUSTOM PROSTHESIS IN METHYLMETHACRYLATE: CASE REPORT

Barreto, Camilla Barros¹; Bastos Junior, Fernando Pereira²; Zerbinati, Livia Prates Soares²;
Assis, Adriano Freitas²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Introdução: As reconstruções maxilofaciais têm como finalidade devolver ao paciente função e estética, contribuindo para uma melhoria na sua qualidade de vida. Através da prototipagem rápida é possível produzir próteses customizadas que, por sua vez, têm como objetivo corrigir o defeito ósseo. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de uma paciente que sofreu trauma facial e que foi submetida à reconstrução com prótese customizada. **Descrição do caso:** Paciente, sexo feminino, leucoderma, 41 anos e vítima de acidente automobilístico em 2005, foi diagnosticada com fratura com perda de substância bicortical das porções dos ossos frontal, temporal e parietal, fratura do assoalho e teto de órbita e fratura com rotação medial do osso zigomático esquerdo. Através da tomografia computadorizada, foi possível realizar a confecção de um protótipo tridimensional que serviu como ferramenta importante para a elaboração da prótese customizada de polimetilmetacrilato (PMMA). A paciente foi submetida à cirurgia para instalação dessa prótese e da malha de titânio em assoalho e teto de órbita esquerda. **Considerações Finais:** O caso demonstrou a importância da utilização de próteses customizadas por possuírem dimensões e formas adequadas para a correção de defeitos ósseos, permitindo a reconstrução craniofacial com maior precisão e menor morbidade.

Palavras-chaves: Traumatismo; cirurgia; próteses

Keywords: Trauma; Surgery Prosthesis