
ANAIS 15^a. JOBA – TEMA LIVRE ACADÊMICO

A GRÁVIDA E A SAÚDE ORAL: A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO

PREGNANT AND ORAL HEALTH: THE IMPORTANCE OF DENTAL PRENATAL

Pinheiro, Carolline Dayube da Costa Pinheiro¹; Santos, Ana Clara Souza¹; Batista, Gêssica Cunha¹; Santos, Letícia Nader¹; Santana, Luana Mendonça Dias¹; Meira, Flávia Carolina Gonçalves de Azevedo².

28. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

29. Professora Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A gestação é um período de muitas transformações na vida da mulher, em que são observadas alterações físicas, fisiológicas e emocionais. Caracteriza-se como uma fase em que a gestante está disposta a obter novos conhecimentos, hábitos e melhores práticas de saúde para o benefício mãe-filho. Por ser um momento de descobertas, mudanças e cuidado, a gestante deve também incluir na sua rotina o pré-natal odontológico, que é importante pois previne complicações como parto prematuro associado à doença periodontal. O pré-natal odontológico se faz necessário para que se tenha uma prevenção ou controle em relação às alterações bucais que venham a ocorrer devido às variações hormonais que podem exacerbar problemas bucais pré-existentes. O presente trabalho visa esclarecer e ressaltar a importância do pré-natal odontológico durante o período gestacional. Esse trabalho consiste em uma revisão de literatura em que será abordado o pré-natal odontológico e manejos adequados durante gestação, baseado em artigos dos últimos cinco anos em inglês e português, nos bancos de dados da Scielo, Pubmed e Bireme. Existe a necessidade de educação em saúde com mulheres gestantes como parte do tratamento odontológico, inserindo-a no acompanhamento pré-natal, para que sejam alcançados efeitos benéficos para si, seu filho e sua família.

Palavras-chaves: Gestante, Complicações na Gravidez, Assistência Odontológica.

Keywords: Pregnant Women, Pregnancy Complications, Dental Care.

A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA NA ODONTOLOGIA

THE IMPORTANCE OF BASIC LIFE SUPPORT IN DENTISTRY

Bravin, Renata Britto de Carvalho; Sobrinho, Antônio Lucindo Pinto de Campos

30. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

31. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O Suporte Básico de Vida (SBV) é um protocolo de atendimento da American Heart Association (AHA) que estabelece o reconhecimento e realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar com o objetivo de manter a vítima de parada cardiorrespiratória viva até a chegada da unidade especializada. O objetivo é ressaltar a importância do conhecimento em Suporte Básico na odontologia. A parada cardiorrespiratória (PCR) é perigosa e inesperada, o que causa uma imensa ameaça à vida. O rápido reconhecimento é de suma importância para a agilidade do atendimento. Nos minutos iniciais, o atendimento precoce de uma vítima de PCR necessita de alguns critérios fundamentais para ação do socorrista como: avaliação da segurança do local, checagem da responsividade da vítima, observar os sinais de respiração e avaliar a presença de pulso, solicitar ajuda e iniciar imediatamente as manobras de compressões torácicas. Pacientes atendidos no consultório odontológico são constantemente submetidos ao estresse gerado pela fobia e a administração de anestésicos locais; fatores estes que podem interferir no sistema cardiovascular e conseqüentemente induzir a uma PCR. Na prática, observa-se que há uma negligência na capacitação constante dos alunos de Odontologia de acordo com o protocolo do SBV da AHA.

Palavras-chave: Suporte Básico de Vida; Odontologia; Parada cardiorrespiratória; Ressuscitação Cardiopulmonar.

Keywords: Basic Life Support; Dentistry; Cardiorespiratory arrest; Cardiopulmonary resuscitation

A IMPORTANTE ATUAÇÃO DA EQUIPE DE CIRURGIÃO BUCOMAXILO- FACIAL NO CARNAVAL DE SALVADOR 2016.

THE IMPORTANT WORK OF THE TEAM OF MAXILOFACIAL SURGEON DURING THE CARNIVAL OF SALVADOR IN 2016.

Brenda Alexsandra Araújo Benedito¹, Luiz Matheus Lago da Costa¹, Antonio Lucindo
Pinto de Campos Sobrinho²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O carnaval de Salvador é a maior festa de participação popular do mundo onde a cidade recebe cerca de três milhões de pessoas vindas de todas as partes do planeta. A reunião dessas pessoas no circuito da festa cria um ambiente hostil atribuindo ao aumento dos traumas por agressões ou quedas, principalmente os traumas de face. A inserção da cirurgia bucomaxilofacial como parte da equipe multidisciplinar do Carnaval de Salvador foi de suma importância, pois se entende como essencial para melhorar os prognósticos do ponto de vista funcional, psicológico e estético dos foliões vítimas de traumatismo facial minimizando as sequelas devido à ação rápida, eficaz e, na maioria das ações, determinando um atendimento definitivo que, conseqüentemente, evita lotações dos grandes hospitais durante o período da folia. Tendo em vista as diversas complicações que podem acometer pacientes vítimas de trauma, justifica-se o estudo abordando da importância do bucomaxilofaciais na equipe multidisciplinar de atendimento. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a logística e estatística de atendimento realizado pela equipe de cirurgiões bucomaxilofaciais como parte da equipe multidisciplinar de atendimento nos postos de saúde distribuídos pelos circuitos do carnaval de Salvador no ano de 2016.

Palavras-chaves: Trauma, face, vítimas, Carnaval.

keywords: Trauma, Face, Victims, Carnaval .

A TRANSFORMAÇÃO DO SORRISO E AUTOESTIMA DO INDIVÍDUO

TRANSFORMATION SMILE AND SELF-ESTEEM GUY

Carvalho, Aline Maia¹; Brandão, Carla, Figueiredo²

1. Aluno do curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)
2. Professora Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

A presença de diastemas nos indivíduos é um fator que vem gerando bastante insatisfação, principalmente quando este é localizado na região anterior superior, comprometendo de forma direta a estética e influenciando significativamente a autoestima do paciente. Procedimentos restauradores conservadores, como clareamento dental e restaurações com resinas compostas ajudam a recuperar as desarmonias existentes, tanto em relação a coloração dos dentes como suas dimensões, possibilitando a obtenção de um sorriso mais agradável, além de ser uma boa alternativa para fechamento de diastemas. Este trabalho teve como objetivo apresentar um caso clínico em que foi planejado realizar clareamento dentário seguido de fechamento de diastema interincisivos, visando melhorar a estética do sorriso. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 25 anos apresentava dentes muito amarelados e com diastema entre os incisivos centrais superiores, relatando estar insatisfeito com o seu sorriso. O plano de tratamento realizado foi inicialmente clareamento dental seguido de fechamento de diastema pela técnica direta de resina composta, de acordo com o protocolo apresentado na literatura. O resultado do tratamento correspondeu às expectativas do paciente, melhorando sua autoestima e o inserindo socialmente. O clareamento dental e o uso das resinas compostas possibilitaram uma reabilitação estética mais conservadora, devolvendo a harmonia ao sorriso.

Palavras-chave: Diastemas, estética dentária, autoestima.

Keywords: *Diastema, dental esthetics, self-esteem.*

A UTILIZAÇÃO DO ESCANEAMENTO 3D DE MODELOS DE GESSO NA ODONTOLOGIA

THE USE OF 3D SCANNING OF PLASTE MODELS IN DENTISTRY

Sobreira, Kerllem Alissa Borges¹; Rios, Gabriela Santos¹; Andrade, Guilherme Meyer².

1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Modelos de gesso são instrumentos de estudo imprescindíveis na odontologia, com eles é possível avaliar, diagnosticar e planejar. Eles são utilizados com frequência para reabilitações orais, tratamento ortodôntico e cirurgia ortognática, pois garantem uma boa reprodução de detalhes, permitindo que objetivos do cirurgião dentista sejam alcançados. Todavia, existem aspectos como, necessidade de espaço físico para armazenamento, risco de danificá-los, tempo e custo para manipulação e transporte, que fizeram com que, surgisse necessidade de buscar formas alternativas para seu armazenamento e registro. Desta forma, o objetivo desse trabalho é abordar a importância do uso de modelos digitais na odontologia. A tecnologia computadorizada é um desenvolvimento avançado na odontologia, possibilitando a digitalização de modelos, substituindo assim os modelos de gesso por modelos virtuais, gerando uma melhora na eficiência, recuperação instantânea de informações de prontuários, facilidade no compartilhamento de informações com outros profissionais, redução de custos e tempo, sem necessidade de espaço físico para armazenamento e sem possibilidade de risco de dano ou perda dos modelos. Mas, ainda assim, o alto custo dos aparelhos, necessidade de profissionais bem treinados e dúvidas acerca da precisão faz com que muitos profissionais optem pelos modelos de gesso. A produção dos modelos digitais pode ser feita a partir da digitalização de tomografia cone-beam, escaneamento intraoral ou captura ótica de modelos de gesso ou do molde de alginato. Compreender a importância desse tipo de registro é importante para que o mesmo seja usado como alternativa aos modelos de gesso, e ainda existe uma carência de estudos para tal.

Palavras-chave: Modelos dentários; software; modelagem.

Keywords: Dental models; software; modeling.

ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES: UMA REALIDADE ATUAL

SELF-ETCH ADHESIVE: A REALITY LATEST

Gomes, Faíza Oliveira ¹, Ribeiro, Mariana Pina Azevedo ¹, Shibasaki, Patrícia Akemi Nishitani ¹, Simões. Francisco Xavier Paranhos Coêlho²; Figueiredo, Carla Brandão ³

1. Graduanda do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

1. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública\

2. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

A crescente procura por restaurações cada vez mais estéticas tornaram os adesivos dentinários parte importante na evolução da Odontologia. Nos últimos anos os materiais, as técnicas e a adesividade que compõe o sistema adesivo sofreram modificações e melhorias. Inúmeros sistemas adesivos surgiram para atender a um mercado mais exigente e melhorar a adesão com a estrutura dentária, dentre eles os autocondicionantes, que apresentam resultados positivos, em curto prazo, em relação à retenção e ao selamento da interface adesiva, além da diminuição do número de passos necessários para realizar a técnica. O presente estudo consiste em abordar a importância dos adesivos autocondicionantes na prática clínica do profissional de Odontologia, enfatizando as vantagens que podem oferecer. Os adesivos autocondicionantes são desenvolvidos para que não haja necessidade de lavagem após sua aplicação e capazes de atuar simultaneamente condicionando os substratos e possibilitando que os próprios monômeros criem via de infiltração na rede colágena desmineralizada. As vantagens consistem em: agir como condicionador e primer simultaneamente; facilidade no uso; redução do número de passos clínicos e conseqüentemente tempo operatório mais curto. Diante dos artigos pesquisados, conclui-se que os adesivos autocondicionantes oferecem eficiência adesiva, boa resistência mecânica, além de ser uma técnica menos sensível, economizando tempo e reduzindo a propensão a erros de manipulação.

Palavras-chaves: Restauração Dentária Permanente. Retenção. Adesividade.

Keywords: Dental Restoration, Permanent. Retention. Adhesiveness.

AMELOGÊNESE IMPERFEITA E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS.

AMELOGENESIS IMPERFECTA AND THEIR CLINICAL IMPLICATIONS.

Santos, Letícia Nader¹; Batista, Géssica Cunha¹; Pinheiro, Carolline Dayube da Costa¹;
Mendes, Laís Alves¹; Bandeira, Juliana Felippi de Azevedo².

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA).
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A amelogênese imperfeita (AI) é um defeito que acomete a superfície do esmalte e apresenta modificações na aparência normal do dente. É influenciada por fatores locais, hereditários ou sistêmicos e pode estar associada ao desenvolvimento de cárie, sensibilidade dentinária, perda da dimensão vertical e comprometimento estético, afetando a autoestima do paciente. Além disso, pode ser dividida em Hipoplásica, Hipocalcificada e Hipomaturada. Na Hipoplásica apresenta esmalte com pouca espessura e/ou fossas e canaletas, na Hipocalcificada a espessura é normal, o esmalte é macio, opaco e branco amarelado, na Hipomaturada, o esmalte se apresenta mais mole que o normal e branco-marrom-amarelado. Pode acometer ambas as dentições com a mesma aparência, dentes amarelados, disformes e de tamanhos alterados. O fenótipo da AI depende do gene envolvido, sua localização e tipo de mutação, e a consequente alteração na proteína. Diferentes padrões hereditários ligados ao cromossomo X, autossômico dominante e autossômico recessivo já foram descritos. O planejamento mais adequado para o tratamento da AI depende, da idade do paciente e da gravidade da anomalia estrutural e pode ser realizada de forma direta ou indireta. Normalmente a reabilitação clínica vem acompanhada de um aumento na autoestima do paciente. O objetivo do presente trabalho é fazer uma revisão de literatura para avaliação das possíveis causas, consequências e sintomas que a amelogênese imperfeita pode ocasionar.

Palavras chaves: esmalte dentário, amelogênese, estética.

Keywords: dental enamel, amelogenesis, esthetics.

ANÁLISE DA CASUÍSTICA DOS TRAUMATISMOS FACIAIS ATENDIDOS PELA CTBMF NO CARNAVAL DE SALVADOR

CASUAL ANALYSIS OF FACIAL TRAUMA AT THE CARNIVAL IN SALVADOR-BA

Costa, Luiz Mateus Lago da¹; Sobrinho, Antônio Lucindo Pinto.

1. Graduando em Odontologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
2. Professor adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

O carnaval de Salvador é uma das maiores festas de participação popular do mundo, recebe cerca de três milhões de pessoas durante os dias de folia. São instalados postos de saúde próximos aos três circuitos carnavalescos para total assistência quanto ao atendimento da população. Devido à necessidade constante de regulação de pacientes aos hospitais e melhorias no atendimento e prognóstico das vítimas de traumas faciais, que em 2009 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) inseriu a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial a equipe multidisciplinar atuando no Carnaval, trabalho pioneiro em todo o mundo. Este estudo tem como objetivo analisar a casuística de traumas faciais atendidos pela equipe de cirurgiões Bucomaxilofaciais durante o Carnaval de Salvador desde 2009 a 2016. Após levantamento dos dados junto a Secretária Municipal de Saúde da cidade de Salvador-Ba e a SAMU, serão tabulados os dados dos prontuários dos pacientes atendidos pela especialidade, nos postos de saúde instalados próximos ao circuito da folia, a fins de especificar os tipos de traumas e os tratamentos realizados nesse período, a evolução do serviço ao decorrer dos anos, afins de comprovar a importância da inserção da especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial na equipe multidisciplinar em atendimento durante o Carnaval de Salvador-Ba.

Palavras-chave: trauma, face, urgência.

Keywords: *Facial Trauma, face, urgency*

ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL ANALYSIS OF SATISFACTION OF DENTURE WEARERS

Palmeira, Monize Meneses¹; Meyer, Guilherme Andrade²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Com a perda dentária e o avanço na área da odontologia, novas formas de reabilitação oral foram desenvolvidas, como as próteses implanto-suportadas, que oferecem aos pacientes uma maior estabilidade e proporcionando uma melhor qualidade de vida. No entanto, nem sempre essas novas formas de reabilitação são possíveis, seja por questões financeiras ou condições orais desfavoráveis. Nesse contexto, as próteses totais removíveis convencionais são uma alternativa viável, mas, em determinados momentos, por conta da falta da acurácia técnica pode refletir na insatisfação final do paciente com o tratamento, podendo assim ocasionar o desuso da peça. No momento da confecção das próteses, um conjunto de fatores deve ser levado em consideração, como: 1) as funções mastigatórias, 2) retenção, 3) estabilidade, 4) adaptação fisiológica, 5) idade do paciente e 6) condição oral do mesmo. Para o sucesso da adequação em boca, essas funções devem estar intimamente interligadas. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, a satisfação dos pacientes reabilitados com próteses totais removíveis convencionais, levando em consideração a expectativa do mesmo em relação ao tratamento e o conjunto de fatores como estética, a boa utilização das funções mastigatórias, retenção, estabilidade e adaptação fisiológica. Foi possível concluir que para que haja a satisfação do paciente, os profissionais devem obedecer a critérios no momento da confecção, devolver as funções mastigatórias, estética, fonética e deglutição, ouvir à expectativa do paciente em relação ao tratamento e assim como esclarecer a limitação de cada caso.

Palavras-chave: Prótese dentária; satisfação do paciente; odontologia; reabilitação.

Keywords: Dental prosthesis; patient satisfaction; dentistry; rehabilitation.

ASPECTOS CLÍNICOS E ANATÔMICOS DA PROGRESSÃO DA DOENÇA CÁRIE

CLINICAL AND ANATOMICAL ASPECTS OF THE PROGRESSION OF CARIES DISEASE

Autores

Sacramento, Grace Kelly Santos¹; Veloso, Soraia².

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora de Odontologia da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC)

Resumo: A cárie dentária é uma doença crônica e infecciosa que pode levar a destruição dos tecidos dentários. As lesões de cárie podem se manifestar clinicamente em estágios iniciais ou em estágios mais avançados. De acordo com os preceitos de Promoção de Saúde, o tratamento da doença cárie visa restabelecer o equilíbrio e a saúde bucal do paciente por meio do controle dos fatores etiológicos, como remoção do biofilme, educação e instrução de higiene e dieta, além da aplicação de fluoretos. Com isso é importante que o cirurgião dentista tenha conhecimento dos diferentes estágios da doença cárie para que o tratamento adequado seja instituído em cada um deles, assim como uma correta orientação ao paciente e ou responsável. O objetivo desse trabalho é expor critérios que favoreçam o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da doença cárie preservando a qualidade de vida do paciente.

Palavras-chaves: Cárie dentária. Biofilme. Doença.

Keywords: Dental Caries. Biofilm. Disease.

AMELOBLASTOMA: CARACTERÍSTICAS DOS TUMORES BENIGNOS E VARIANTES MALIGNAS

Leite, Samara Angel Silva¹ Queiroz, Leila Brito

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA).
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O ameloblastoma é um tumor benigno, de revestimento lento e assintomático, com origem aos restos epitelial, possui crescimento lento e assintomático. O acometimento ocorre na maxila, e mais frequente na mandíbula, especificamente em região posterior, ângulo, ramo ascendente. Prevalente entre a terceira e sétima década de vida, e não há predileção por sexo, raça e região geográfica. Clinicamente, apresenta-se com discreto edema, assimetria facial e abaulamento na cortical óssea. Possui um alto potencial para infiltrar e ocorrer recidiva da lesão. Apresenta um comportamento biológico raro, em 2005 a ONU, modificou sua classificação, separando o AM em: Ameloblastoma benigno, carcinoma ameloblástico e ameloblastoma maligno A lesão só pode ser diagnosticada através de exames histopatológicos e de exames imaginológicos, incluindo as radiografias, tomografias computadorizadas e ressonância magnética. Na literatura, existem várias controvérsias relacionadas à conduta clínica do tratamento, desde maneiras conservadoras como curetagem e enucleação à formas radicais como ressecção segmentar, crioterapia e tratamento com laser.

Palavras-Chave: Ameloblastoma; Neoplasia.

Keywords: Ameloblastoma; Neoplasms.

LESÕES NERVOSAS EM ODONTOLOGIA – ABORDAGEM CLÍNICA DA PARESTESIA.

NERVE INJURY IN DENTISTRY - CLINICAL APPROACH OF PARESTHESIA.

CRUZ, Elberty Felipe Souza Silva¹; AZOUBEL, Eduardo ²; AZOUBEL, Maria Cecília
Fonsêca³.

1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Apesar dos poucos relatos e discussões acerca das lesões nervosas decorrentes de procedimentos odontológicos, a incidência significativa revela a necessidade de mais estudos sobre esse tema. A literatura já evidencia que a quantidade de relatos pode ser resultado de um passado onde a relação dessas lesões com os procedimentos bucodentários foi menosprezada pela falta de uma investigação mais aprofundada. Porém, os índices estatísticos demonstram a prevalência significativa de paralisia facial periférica e parestesia consequentes de procedimentos odontológicos, estando a última frequentemente relacionada a procedimentos menores e rotineiros como a exodontia de terceiros molares, enxertos e implantes. Portanto o presente trabalho tem por objetivo apresentar os principais dados relacionados a lesões nervosas encontrados na literatura, com ênfase na parestesia, suas causas, prevenção, diagnóstico e tratamentos disponíveis para uma adequada abordagem clínica. Para a sua elaboração, foi realizada uma revisão da literatura nos bancos online Medline, Bireme, Scielo e Lilacs, selecionando artigos datados entre 2001 e 2014 numa busca com as palavras-chave: lesões nervosas, parestesia, laserterapia e complexo B. A partir desse trabalho foi possível constatar que há dados relevantes sobre a abordagem clínica das paralisias decorrentes de lesões nervosas, porém ainda se faz necessário discutir e conscientizar os cirurgiões dentistas sobre a prevalência significativa e os métodos de prevenção, assim como é necessário avançar nos estudos referentes aos reparos dessas lesões e seus tratamentos.

Palavras-chave: Ferimentos e Lesões; Parestesia; Terapêutica.

Keywords: *Wounds and Injury; Paresthesia; Therapeutics.*

CÂNCER ORAL: O QUE O CLÍNICO PRECISA SABER?

ORAL CANCER: WHAT THE CLINICAL NEED TO KNOW?

Santos*, Rodrigo Araújo¹; Nascimento, Nathália Costa¹; Albuquerque, Gabriele Oliveira Cavalcanti¹; Gomes, Matheus Coelho¹; Cardoso, Juliana Andrade².

1. União Metropolitana para Desenvolvimento da Educação e Cultura, campus Lauro de Freitas.
2. Especialista em Estomatologia pela União Metropolitana para Desenvolvimento da Educação e Cultura; Mestre em Estomatologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / Docente do Núcleo de Propedêuticas Clínicas e Cirúrgicas da União Metropolitana para Desenvolvimento da Educação e Cultura, campus Lauro de Freitas.

Considerado um problema de saúde pública mundial, o câncer oral é uma doença de etiologia multifatorial, precipitada por fatores endógenos como a predisposição genética e fatores exógenos comportamentais e ambientais como uso do tabaco, ingestão de bebidas alcoólicas, infecção pelo vírus HPV, exposição à radiação solar e produtos químicos carcinogênicos. Tem maior prevalência em pacientes do sexo masculino a partir da 5^a década de vida. Embora os níveis de morbimortalidade provocados por essa neoplasia sejam elevados, percebe-se a falta de conhecimento e descaso por parte dos pacientes bem como do cirurgião-dentista no tocante à prevenção. Estudos demonstram que a manifestação inicial raramente é diagnosticada e 60% a 80% das lesões têm sua identificação em estágio avançado, revelando o desconhecimento por parte dos pacientes e profissionais acerca dos sinais da doença e métodos preventivos. Sabendo que quando diagnosticado em estágios iniciais a chance de cura do câncer oral pode chegar a 90%, este trabalho objetiva apresentar as principais características clínicas das lesões potencialmente malignas, aspectos clínicos do câncer oral que, em estágio inicial é silencioso, não provocando dor ao paciente, bem como formas de prevenção aliadas ao autoexame para promover diagnósticos em estágios iniciais.

Palavras-chave: Neoplasias Bucais, Neoplasia, Diagnóstico

Keywords: Mouth Neoplasms, Neoplasms, Diagnosis

CISTO DO DUCTO SALIVAR EM GLÂNDULA SALIVAR MENOR: RELATO DE CASO

Dos Santos, Rafael Rodrigues¹; Carvalho, Mariana¹; Santana, Thalita Teixeira¹;
Braga, Giele Tenisi¹; Lamberti, Patricia Leite Ribeiro²; Leitão, Aguida Cristina Gomes
Henriques²

¹. Alunos do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA);

². Professor Adjunto da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA).

Introdução: O Cisto do Ducto Salivar (CDS) é uma lesão rara que se apresenta como uma cavidade delimitada por epitélio, que tem origem a partir do tecido glandular salivar. Usualmente ocorrem em adultos e pode acometer tanto glândulas salivares maiores quanto menores. Clinicamente se apresenta como um aumento de volume indolor, flutuante, de consistência amolecida e coloração azulada. O CDS assemelha-se a Mucocele, entretanto ele é um cisto de desenvolvimento verdadeiro delimitado por epitélio e separado dos ductos salivares normais adjacentes. **Objetivo:** Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de CDS em glândula salivar menor, apresentando suas características clínicas, histopatológicas, além dos possíveis diagnósticos diferenciais. **Descrição do caso:** Paciente G.S.B, sexo feminino, 22 anos, faioderma, compareceu ao serviço de Estomatologia da FOUFBA, queixando-se de uma bolha abaixo da língua. Ao exame intraoral, observou-se uma lesão em assoalho bucal, de aspecto vesicular, coloração amarelada, de aproximadamente 1cm e 1 mês de evolução. Após hipótese clínica de mucocele, foi realizada biópsia excisional, seguido do exame anatomopatológico, o qual revelou características morfológicas do CDS. A paciente encontra-se em proervação há 02 meses sem sinais de recidiva da lesão. **Conclusão:** O assoalho bucal é um dos sítios mais acometidos por CDS em glândulas menores, entretanto devido a sua raridade, esta lesão pode ser confundida com a mucocele ou outros cistos do desenvolvimento. Destaca-se ainda a importância do estudo histopatológico para o diagnóstico diferencial desta lesão e a importância do Cirurgião-Dentista em conhecer as diferentes patologias que acometem as glândulas salivares.

Palavras-chaves: patologia bucal, glândulas salivares, cistos maxilomandibulares,
Keywords: oral pathology, salivary glands, jaw cysts.

CISTOADENOMA PAPILÍFERO LINFOMATOSO: RELATO DE CASO EM GLÂNDULA SALIVAR MENOR

PAPILLARY LYMPHOMATOUS CYSTADENOMA: CASE REPORT ON SMALLER SALIVARY GLAND

Santana, Thalita Teixeira¹; Dos Santos, Rafael Rodrigues ¹; Braga, Giele Tenisi ¹; Ribeiro,
Patrícia Leite ²; Henriques, Águida Cristina Gomes ².

1. Aluno da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Professora Adjunta da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

O Cistoadenoma Papilífero Linfomatoso (CPL) corresponde a um neoplasma benigno que ocorre quase exclusivamente na glândula parótida. Apesar de sua patogênese ainda ser incerta, há pressupostos que essa lesão tenha origem de um tecido glandular heterotópico encontrado dentro dos linfonodos parotídeos ou da proliferação do epitélio ductal salivar associada a um tecido linfoide. Raramente, o CPL pode desenvolver-se na glândula submandibular e em glândulas salivares menores. Geralmente, ocorre em indivíduos idosos, brancos, com maior frequência em homens, como um nódulo indolor de crescimento lento. Esse trabalho se propõe relatar um caso de CPL, destacando suas características clínicas, seus aspectos histopatológicos e possíveis diagnósticos diferenciais. JPB, sexo feminino, 51 anos de idade, procurou a faculdade de odontologia da UFBA, queixando-se de caroço em mucosa jugal. Ao exame clínico intraoral, a lesão apresentou aspecto de vesícula, coloração translúcida, medindo aproximadamente 1.0cm, com hipótese diagnóstica de mucocele. Foi realizada biópsia excisional, seguida de exame anatomopatológico e a lesão apresentou os critérios morfológicos compatíveis com o CPL. Nessa perspectiva, ressalta-se a relevância do cirurgião-dentista conhecer os aspectos clinicopatológicos dessa lesão, a fim de fazer diagnóstico diferencial com lesões mais comumente encontradas na prática ambulatorial. O paciente encontra-se em acompanhamento e não tem apresentado sinais de recidiva até o momento.

Palavras-chave: Cistoadenoma, Biópsia, Odontologia

Keywords: Cystadenoma, Biopsy, Dentristry

CLASSIFICAÇÃO DOS DEFEITOS MAXILARES

MAXILARE DEFECTS CLASSIFICATION

Santana, Luana Mendonça Dias¹; Meyer, Guilherme Andrade², Leon, Blanca Liliana²;

Lira, Andréa Fabiana²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Introdução: Os defeitos dos maxilares quando conhecidos e melhor esclarecidos visam o aprimoramento do conteúdo disciplinar de todo profissional em saúde que deseja trabalhar no tratamento das áreas compreendidas entre a cabeça e o pescoço. Para que esse conhecimento fosse melhor esclarecido, Aramany e Cols em 2001, estabeleceram uma divisão didática que originou os defeitos de classe: I,II,III,IV,V e VI dos maxilares.

Objetivo: O presente trabalho visa esclarecer e demonstrar os tipos de defeitos maxilares, estabelecidos pela literatura. **Metodologia:** Serão apresentados oralmente, como tema livre, os tipos de defeitos, descritos por Aramany em 2001 e Cols, através de desenhos dos maxilares, contendo em cada região o tipo de defeito associado, considerando o prognóstico cirúrgico de cada caso e as características importantes a serem consideradas no planejamento protético. **Resultados:** De acordo com o tipo de defeito, maior/ melhor será o prognóstico do tratamento reabilitador, seja ele cirúrgico ou protético. **Conclusão:** Todos os tipos de defeitos aspiram cuidados no planejamento integrado, portanto, devem ser melhor esclarecidos ao público que pretende tratar destas áreas, tanto cirurgicamente quanto proteticamente.

Palavras-chaves: Prótese maxilofacial; Maxila; Implante de prótese maxilofac

Keywords: *Maxillofacial prosthesis; Maxilla; Maxillofacial prosthesis implantation.*

COMUNICAÇÃO BUCOSSINUSAL: REVISÃO DE LITERATURA OROANTRAL COMMUNICATION: LITERATURE REVIEW

Autores: Souza, Ítala Sued Carneiro¹; Brito, Jéssica Silva¹; Cavalcante, Igor Rafael Gomes²; Pereira Junior, Fernando Bastos³.

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Residente de cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial pela EBMSP/HGRS
3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A comunicação bucosinusal é um acesso direto entre o seio maxilar e a cavidade bucal. Pelo fato do seio maxilar ser um espaço pneumático de grande volume e em proximidade com os ápices de alguns dentes superiores, em algumas circunstâncias, tem-se acesso direto entre este e a cavidade bucal. Quando a comunicação entre as cavidades se reveste por tecido epitelial, passa a se chamar fístula bucosinusal, que é uma manifestação tardia. O fator etiológico mais comum da comunicação bucosinusal são os acidentes durante as exodontias na região posterior da maxila. Existem outros fatores etiológicos como traumatismo gerado pelo uso inadequado de instrumentos, destruição do seio maxilar por lesões periapicais e remoção de cistos ou tumores do palato ou do seio maxilar. As principais complicações da comunicação bucosinusal são sinusite maxilar, refluxo de líquido pelo nariz e infecções. O diagnóstico envolve procedimentos clínicos e de imagens, realização da Manobra de Valssalva e sondagem. O tratamento é o fechamento dessa comunicação, através de diferentes técnicas, como o método cirúrgico do enxerto pediculado do corpo adiposo bucal, retalhos palatinos, e retalhos vestibulares. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre comunicação bucosinusal, enfocando as principais técnicas cirúrgicas para o tratamento.

Palavras-chaves: Seio maxilar, Comunicação, Fístula

keywords: Maxillary Sinus, Communication , Fistula

CONFEÇÃO DE PROVISÓRIO EM PRÓTESE FIXA PELA TÉCNICA DIRETA DA MOLDAGEM X REEMBASAMENTO (CASCA DE OVO)

PRODUCTION OF PROVISIONAL IN FIXED PROSTHESIS THROUGH THE DIRECT TECHNIQUE OF MOLDING X RELINE (EGG SHELL)

Chastinet, Milla¹; Silva, Iuna¹; Leon, Blanca Liliana²; Feitosa, Paulo ²; Lira, Andréa Fabiana²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Através dos provisórios é possível a proteção do remanescente dentário dos estímulos térmicos pulpares; tendo como principal função restaurar a forma e a estética, devolvendo o conforto para o paciente; desde que alcance a manutenção da saúde periodontal, ofereça possibilidades estéticas, fonéticas e a checagem do preparo e da oclusão adequada, para maiores previsibilidades protéticas. O presente trabalho sob a forma de slide visa demonstrar uma técnica direta de confecção de provisórios sobre dentes nas reabilitações protéticas. Serão demonstrados na forma de slide, todos os passos na confecção da técnica de moldagem do dente anterior ao preparo com reembasamento do molde após o preparo com resina acrílica autopolimerizável para obtenção da escultura dental e posterior acabamento e polimento. Visando o conhecimento de técnicas simplificadas de confecção de provisórios, espera-se que os profissionais em formação que desejam atuar na área da prótese dentária, estabeleçam sempre parâmetros de obtenção e utilização dos provisórios diretos, para obtenção de melhores previsibilidades de resultados e adequação da técnica que melhor seja possível executar. Os provisórios diretos realizados por esta técnica são simples de serem executados e reestabelecem a forma e a função adequadamente, contudo, esta etapa de provisionalização independente da técnica, não deve ser subestimada em todas as opções reabilitadoras bem sucedidas sobre dentes em próteses fixas.

Palavras chave: prótese dentária, estética, preparo do dente.

Keywords: *dental prostheses, esthetics, tooth preparation.*

CONSIDERAÇÃO CLÍNICAS EM LÂMINADOS CERÂMICOS

CLINICAL CONSIDERATIONS IN CERAMIC LAMINATES

Silveira, Iago Portela¹; Santana, Luana Mendonça¹; Accioly, Philippe Silva¹;
Chastinet, Milla Fernanda Aleluia¹; Bastos, Luiz Gustavo Cavalcanti²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A estética dos dentes anteriores é algo que influência bastante no bem estar das pessoas, e por isso cada vez mais pessoas procuram por tratamentos estéticos. Ao longo do tempo as técnicas e materiais disponíveis vem evoluindo e tornando o resultado mais preciso e previsível, satisfazendo estética e funcionalmente tanto o paciente quanto o profissional. Isso justifica o uso, cada vez mais frequente dos tratamentos com facetas ou laminados cerâmicos. O presente trabalho realiza uma revisão acerca do tratamento com estas restaurações estéticas cerâmicas, com o objetivo de descrever a sequência da confecção de laminados cerâmicos embasados em artigos atuais, e caracterizar a importância de uma correta indicação e planejamento de cada caso, respectivamente com suas contra indicações e desvantagens. Serão abordados também os tipos de materiais para os laminados, sua estabilidade de cor e resistência, tipos de preparo no que se refere aos tratamentos em que o desgaste é diretamente proporcional ao resultado desejado; cimentação, no que os materiais para esse fim podem colaborar, não só para a adesão da cerâmica como no aspecto final da cor. A confecção de laminados cerâmicos envolve um rigoroso protocolo e uma abordagem clinica consciente dos procedimentos, e dessa forma se torna necessário cautela e habilidade do profissional, juntamente com disponibilidade e aceitação do paciente para a realização de um sorriso harmônico e duradouro.

Palavras-chave: Prótese dental; Estética dentária; Porcelana dental.
Keywords: *Dental Prosthesis; Esthetics Dental; Dental porcelain.*

DESMISTIFICANDO O USO DE ANESTÉSICOS LOCAIS ASSOCIADOS A VASOCONSTRITORES EM PACIENTES GESTANTES HIPERTENSAS: REVISÃO DE LITERATURA

DEMYSTIFYING ANESTHETICS USE LOCAL ASSOCIATED WITH PREGNANCY IN PATIENTS VASOCONSTRICTOR HYPERTENSION: LITERATURE REVIEW

Lopes, Sandy Natthalie¹; Júnior, Agenor Jesus¹; Maniçoba, Éder Freire¹; Teixeira, Ágda Braga¹; Beltrame, Mônica²

1. Graduandos do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
2. Profa. Dra. Pleno, Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

INTRODUÇÃO: A anestesia local é definida como um bloqueio reversível da condução nervosa, determinando perda das sensações sem alteração do nível de consciência. No contexto da clínica odontológica, os anestésicos são bastante empregados, mas sua utilização em pacientes grávidas ainda é muito discutida no meio científico, tornando a assistência ainda mais complexa nos casos de gestantes hipertensas. De modo que o profissional não só é responsável pelo atendimento eficaz e seguro, mas também deve preocupar-se com o período gestacional crítico, o primeiro trimestre, caracterizado como a etapa de formação dos órgãos do embrião, e também o último trimestre, visto que a paciente se encontra com peso elevado, e com facilidade de entrar em exaustão. Tradicionalmente, alguns profissionais da área odontológica, têm demonstrado preocupação em desmistificar a crença popular, ainda hoje bastante arraigada, de que mulheres grávidas não podem receber assistência odontológica devido as incertezas dos riscos que podem ocorrer no corpo da mãe e do feto e ao desconhecimento do assunto. Pensando em desconstruir essa crença, e com a finalidade de elucidar considerações importantes sobre o atendimento de gestantes hipertensas, esse trabalho tem por **OBJETIVO:** revisão de literatura, que possibilite o cirurgião dentista adequar o tratamento odontológico, e preservar as condições de saúde bucal da gestante. **METODOLOGIA:** Foram pesquisados artigos científicos para elaboração do trabalho com bases da Scielo e gruponitro - excelência em odontologia. **CONCLUÍMOS** que, em relação a administração de anestésicos com vasoconstritores em gestantes hipertensas, quando os benefícios superarem os riscos, os mesmos devem ser utilizados.

Palavras-chaves: Anestésicos locais; Vasoconstritores; Hipertensão; Gestantes.

keywords: Local anesthetics; Vasoconstrictor Agents; Hypertension; Pregnant Women

ERGONOMIA RELACIONADA À ODONTOLOGIA **ERGONOMY ASSOCIATED WITH ODONTOLOGY**

Autores

Costa, Caio Machado N.¹; Dantas, João Vitor¹; Nunes, Ana Carla R.²; Peixoto, Iza Teixeira A.²; CRISTINO, Patrícia Suguri²; Almeida, Tatiana Frederico de²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professoras Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A ergonomia é de fundamental importância para a Odontologia. Quando se trata de ergonomia, refere-se ao desenvolvimento de dados e métodos, normas, além de técnicas que regulam as posturas a serem tomadas em cada procedimento. Visa à otimização do trabalho profissional e a manutenção da qualidade do seu serviço, bem como sua saúde física e psicológica. O termo vem do latim “ergon” (trabalho) e “nomos”, ou seja, relação direta com o trabalho em si e com as leis que as regulam. desse trabalho é revisar os aspectos ergonômicos relacionados à postura do cirurgião-dentista durante seu atendimento, através de protocolos e revisões de literatura. Foi realizada uma busca em revisões sistêmicas para coleta de dados entre 2006 à 2016, a fim de analisar quais normas deveriam ser seguidas para evitar possíveis patologias, com a intenção de manter a saúde do cirurgião-dentista seja física ou mental. As partes do corpo com queixas maiores pelos CD são a região da lombar, pescoço, punho e os dedos. Porém, as normas ergonômicas foram estabelecidas para poder evitar movimentos que prejudiquem principalmente a coluna, proporcionar maior conforto e segurança, melhorar a efetividade do trabalho em um menor tempo e, assim, em conjunto, promover uma melhor qualidade de vida. O cirurgião dentista (CD) é muito apontado com relação aos riscos que posturas erradas podem causar, sendo de suma importância o papel da ergonomia para regular esses aspectos e, conseqüentemente, para sua saúde.

Palavras-chaves: Ergonomia; Odontologia; Saúde do trabalho; Cirurgião-dentista

Keywords: Ergonomy; Odontology; Job Health; Dental surger

FORMEI, E AGORA? I GRADUATED, AND NOW?

CRUZ, Elberty Felipe Souza Silva¹; PALMEIRA, Monize Menezes¹; ROSA, Bruno Trevisan²; BOTTO, Renata Cardoso Nunes³.

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Mestre em Odontologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professora Auxiliar da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Pesquisas mais recentes na literatura demonstram que é crescente a preocupação dos discentes egressos dos cursos de odontologia com relação a sua iniciação no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que é possível perceber transformações de cunho social, cultural e econômico que levam a mudanças significativas no mercado clássico da profissão e o surgimento de novas opções de segmentos de trabalho. Essas mudanças demonstram a importância das escolas de ensino odontológico repensarem a necessidade de formar profissionais além da técnica para que adquiram autonomia e conhecimento para gerirem suas carreiras. O presente trabalho objetiva elucidar e explicar os principais conhecimentos e dados da literatura quanto a gestão de carreira e mercado de trabalho da odontologia incentivando os odontólogos e futuros a gerirem sua carreira e suas escolhas iniciais. Par isso foi realizado uma busca nos bancos online, onde selecionou-se artigos datados entre 2006 a 2016 e sites de órgãos competentes a classe trabalhista. Através desse trabalho, percebeu-se que existe sim oportunidade de trabalho, porém é preciso escolher e se autogerir de forma consciente.

Palavras-chaves: Recursos Humanos em Odontologia; Planejamento; Odontologia
keywords: *Dental Staff; Dentistry; Planning.*

HERPES LABIAL RECORRENTE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

HERPES RECURRING LIP: A LITERATURE REVIEW

Lopes, Tâmara Thayruze ¹; Dantas, Leila Ticiane¹; Cruz, Lorena Silva¹; Beltrame, Mônica².

- 1- Alunos do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
- 2- Profa. Dra. Pleno, Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

O herpes simples representa a doença viral mais comum no homem moderno, as lesões recorrentes do herpes simples são altamente contagiosas para os pacientes, suas famílias, profissionais da saúde e auxiliares, mesmo após alguns dias de regressão das lesões. O vírus é classificado em HSV-1 e HSV-2, ambos com estruturas semelhantes, mas antigenicamente diferentes. O HSV-1 caracteriza-se por quadros extragenitais, disseminando-se através da saliva infectada ou lesões periorais ativas, sendo a gengivoestomatite herpética a manifestação clínica bucal mais frequente, enquanto que o HSV-2 envolve quadros perigenitais. Após a infecção primária por HSV-1, o vírus penetra nos nervos sensitivos periféricos e migra pelos axônios até os gânglios sensitivos regionais, onde permanece em latência até ser rompido por fatores desencadeantes. Esse trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre herpes labial recorrente, permitindo, assim, a compilação de informações importantes e atualizadas sobre essa temática. Conclusão: até os dias de hoje não há uma terapêutica completamente eficaz no combate do HSV-1. As crises recorrentes promovem desconforto e comprometem a estética facial do indivíduo, prejudicando-o em suas relações sociais. Por esse motivo, se faz necessária a existência de novas terapias mais efetivas e o controle dos fatores desencadeantes, para, dessa forma, melhorar a qualidade de vida do paciente.

Palavras-chaves: Herpes simples. Doença infecciosa. Infecção viral.

Keywords: Herpes simplex. Infectious disease. Viral infection.

HPV: A RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DO CARCINOMA ESCAMOCELULAR ORAL

HPV: THE RELASHIONSHIP WITH THE DEVELOPMENT OF ORAL SQUAMOUS CARCINOMA

Campos, Kamila¹; Ribeiro, Leila Brito de Queiroz.²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professoras Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O câncer oral é o sexto tipo de câncer de maior incidência no mundo. Estudos epidemiológicos no Brasil apontam a prevalência maior em homens com risco de 11:100.000 pessoas. Dentre os fatores de risco para o câncer oral estão o tabagismo, o alcoolismo e agentes biológicos como o papilomavírus humanos (HPV), que infecta mucosa oral e genital. Existem mais de 180 tipos de vírus HPV identificados, e destes 30 tipos estão relacionados com infecções orais, os quais são divididos em dois grupos, o HPV de baixo risco associados a lesões orais benignas e HPV de alto risco associado com as lesões malignas do epitélio oral. O HPV, pertence à família *Papillomaviridae* e são vírus de DNA que produzem oncoproteínas, as quais atuam sobre as proteínas reguladoras de DNA p53 e pRb, induzindo uma instabilidade genômica, propiciando mutações que favorecem o desenvolvimento de neoplasia de caráter maligno. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura acerca da participação do HPV na etiologia do carcinoma escamocelular na cavidade oral.

Palavras-chave: Papillomaviridae, Carcinoma de Células Escamosas

Key-words: Papillomaviridae, Squamous Cell Carcinoma

INFILTRAÇÃO BACTERIANA NA INTERFACE IMPLANTE-PILAR NAS CONEXÕES HEXÁGONO EXTERNO E CONE MORSE

BACTERIAL LEAKAGE IN THE IMPLANT-ABUTMENT INTERFACE IN CONNECTIONS EXTERNAL HEXAGON AND CONE MORSE

Vitória, Mariely Monteiro¹; Bastos, Luiz Gustavo Cavalcanti²

1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A reabilitação com implantes osseointegráveis tem sido considerada uma opção de tratamento previsível para o paciente, reabilitando a estética e função mastigatória. O sucesso das reabilitações implantossuportadas está relacionado diretamente com o processo da osseointegração. Porém, podem ocorrer fracassos por complicações de origem mecânicas e/ou biológicas, e com isso surgiu a necessidade de criação de diferentes sistemas de conexão protética, os mais comumente utilizados são o hexágono externo, hexágono interno e o cone morse. Os sistemas de implantes constituídos pelo pilar e intermediário tem demonstrado a presença de fendas que favorecem a colonização bacteriana podendo desencadear reações inflamatórias ao redor dos tecidos periimplantares, comprometendo a osseointegração e o sucesso do tratamento a longo prazo. O objetivo desse trabalho foi, de por meio de uma revisão de literatura, discutir sobre a infiltração bacteriana na interface implanteintermediário nos sistemas hexágono externo e cone morse. Concluiu-se que a fenda está sempre presente na conexão hexágono externo e que somente implantes de conexões cônicas podem promover um selamento ideal, que evite a infiltração bacteriana.

Palavras-chave: Implantes Dentários, Crescimento Bacteriano, Osseointegração
Keywords: Dental Implants, Bacterial Growth, Osseointegration

LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DO LÍQUEN PLANO ORAL

LASER THERAPY IN TREATMENT OF ORAL LICHEN PLANUS

Costa¹, Rodrigo Martins Nogueira; Farias², Jener Gonçalves de; Vilela², Deyla Duarte Carneiro; Cardoso, Juliana Andrade²

1. Aluno do Curso de Odontologia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)
2. Professores do Núcleo de Propedêuticas da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)

Introdução: O líquen plano oral (LPO) é uma lesão inflamatória crônica, relativamente comum que acomete a cavidade bucal. Seu tratamento, na maioria das vezes, se dá com uso de corticosteróide tópico, podendo casos mais graves serem tratados sistemicamente.

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico de líquen plano oral tratado com laserterapia em baixa intensidade associado ao tratamento tópico.

Desenvolvimento: Embora seja classificada como uma doença autoimune, mediada por células T, a causa do LPO permanece desconhecida. As diferentes formas de manifestação da lesão podem se apresentar simultaneamente e a morfologia clínica predominante pode mudar ao longo do tempo em um mesmo doente. As lesões de LPO são quase sempre bilaterais e simétricas e os locais mais acometidos são mucosa jugal, gengiva, dorso da língua, mucosa labial e vermelhão do lábio. O laser é uma luz amplificada (luz pura) que apresenta características próprias, atuando em inúmeras áreas de modo pontual. A laserterapia em baixa intensidade é um tratamento indolor, baseado na aplicação do laser gerado por diodos emissores de luz para ativar ou inibir a atividade celular. A paciente do caso em questão, idosa, sexo feminino, queixava-se de ardência e dor na mucosa jugal e língua. Ao exame foi constatada a presença de lesões de LPO. **Considerações finais:** A paciente foi tratada com laserterapia em baixa intensidade, associada ao uso tópico de dexametasona elixir, obtendo bons resultados clínicos e reduzindo consideravelmente a sintomatologia.

Palavras-chaves: Líquen Plano Oral; Tratamento; Terapia a Laser

Keywords: *Lichen Planus; Therapy; Laser Therapy*

LESÕES POTENCIALMENTE MALIGNAS: DIAGNÓSTICO, CLASSIFICAÇÃO E FATORES PREDITIVOS

INJURIES POTENTIALLY MALIGNANT: DIAGNOSIS, CLASSIFICATION AND PREDICTIVE FACTORS

Braga, Giele Tenisi¹; Santana, Thalita Teixeira¹; dos Santos, Rafael Rodrigues¹; Ribeiro, Patrícia Leite²; Henriques, Águida Cristina Gomes²

1. Alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA)
2. Professoras Adjuntas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA)

Introdução: As lesões potencialmente malignas (LPMs) correspondem às alterações teciduais que apresentam um risco maior que o normal para se transformar em um câncer, pois compartilham algumas alterações morfológicas e moleculares com as neoplasias malignas de origem epitelial. Considerando que a prevenção e tratamento adequado dessas lesões implicam em redução da morbidade e mortalidade do câncer oral, trata-se de um tema de importante abordagem. **Objetivo:** Revisar a literatura quanto aos principais métodos de diagnóstico das LPMs, os sistemas de classificação relacionados ao diagnóstico histopatológico e fatores preditivos associados ao maior risco de transformação maligna. **Desenvolvimento:** Suas principais apresentações clínicas são leucoplasia, eritroplasia, eritroleucoplasia e queilite actínica. Histopatologicamente, as possibilidades de diagnóstico variam desde hiperqueratose, até carcinoma, havendo diferentes graus de displasia epitelial, que são utilizados para gradar a intensidade de alterações citológicas e arquiteturais. Essas alterações são diretamente responsáveis pela gravidade da lesão, uma vez que o aspecto clínico nem sempre expressa o real comprometimento histopatológico. O risco de transformação maligna que as LPMs apresentam é variado, dependendo de características clínicas, do grau de displasia, de alterações genéticas e de outros fatores associados. **Considerações Finais:** O diagnóstico precoce de uma LPM permite a possibilidade de evitar a progressão para o carcinoma escamocelular oral, através do tratamento adequado e da preservação, representando um ganho imensurável para o paciente. Dessa forma, o estudo das LPMs se faz imprescindível na formação do cirurgião-dentista, bem como a necessidade de constante atualização com relação ao diagnóstico e fatores associados ao maior risco de malignização.

Palavras-chave: *Carcinoma de células escamosas; patologia; diagnóstico.*

Keywords: *Carcinoma, squamous cell; pathology; diagnosis.*

MANEJO ODONTOLÓGICO DO PACIENTE COM ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO DE LITERATURA

DENTAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH SICKLE CELL ANEMIA: LITERATURE REVIEW

Bandeira, de Oliveira Ingrid¹. Naves, Catapano Roberta²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A doença falciforme ou drepanocitose é autossômica dominante, onde ocorre uma mutação genética no gene β , com modificação do sexto aminoácido, substituindo o ácido glutâmico pela valina. Essa alteração provoca uma modificação nos eritrócitos, fazendo-os tomar a forma de “foice” ou “meia-lua”, perdendo sua função fisiológica natural. A drepanocitose é uma doença com múltiplas complicações e endêmica no Brasil, desta forma o cirurgião-dentista deve ter o conhecimento adequado frente a esta enfermidade. A anemia falciforme possui várias manifestações clínicas e bucais, portanto este trabalho tem como objetivo elucidar de forma clara e direta o manejo do paciente falciforme diante das peculiaridades da doença. O quadro clínico da drepanocitose ocorre por causa da “falcização” das hemácias, que resulta em anemia hemolítica, crises vasclusivas e infecções bacterianas, portanto, as manifestações bucais estão relacionadas a essas complicações. As alterações bucais mais comuns são osteomielite, palidez da mucosa oral, neuropatia do nervo mandibular, necrose pulpar assintomática, dor orofacial, atraso na erupção dentária, hipomineralização do esmalte e dentina, língua lisa, descorada e despapilada, periodontite, alta susceptibilidade a cárie, padrão ósseo alterado da maxila e mandíbula, microdontia, supranumerários, pigmentação dentária. O conhecimento sobre o manejo odontológico do paciente falcêmico é de grande importância, já que a doença se faz endêmica no Brasil, e a Odontologia tem participação importante na amenização e tratamento das manifestações bucais.

Palavras-chaves: anemia falciforme, manifestações bucais, tratamento odontológico

Keywords: sickle cell anemia, oral manifestations, dental care

MATERIAIS UTILIZADOS PARA PULPOTOMIA EM DENTES DECÍDUOS

MATERIALS USED FOR PULPOTOMY IN DECIDUOUS TEETH

Mota Itana¹; Albernaz Antístenes².

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica que tem como objetivos descrever as alternativas de materiais obturadores mais utilizados na pulpotomia. Efetuou-se uma busca abrangendo artigos de periódicos indexados nas Bases de Dados: PubMed, Scielo, Medline, Bireme, dissertações, livros e capítulos de livros. Foram analisados 20 documentos com períodos de 2 a 15 anos de publicação. Com base nesses estudos, foram descritas técnicas de pulpotomia com formocresol, hidróxido de calico e pasta Guedes Pinto. Conclui-se que o tratamento do paciente que está indicado fazer a pulpotomia, deve ser avaliado pelo cirurgião-dentista indicando o melhor material obturador para cada situação específica.

Palavras-chaves: Endodontia; Materiais; Pulpotomia.

keywords: Endodontics, Materials, pulpotomy.

POSTURA ANTERIOR DE LÍNGUA: DIAGNÓSTICO E ABORDAGEM CLÍNICA

TONGUE THRUST POSTURE: DIAGNOSIS AND CLINICAL APPROACH

Barreto, Mariana Pereira¹; Franco, Fernanda Catharino Menezes².

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A mordida aberta anterior é um tipo de má oclusão, caracterizada pela falta de contato vertical entre os dentes superiores e inferiores, que apresenta grande tendência a recidiva após tratamento. É um tipo de problema clínico considerado de difícil correção, sobretudo no que se refere à estabilidade. A influência da postura anterior de língua e seus efeitos deletérios como causa de má oclusão, vem sendo evidenciada por afetar diretamente o sucesso e estabilidade dos tratamentos ortodônticos. Brauer e Holt produziram uma classificação da mordida aberta anterior, baseada na alteração resultante da pressão lingual sobre os dentes, definindo o potencial de deslocamento e deformidade dentária que o hábito possui. A postura lingual durante o repouso, associando frequência, duração e intensidade desse estímulo, é capaz de afetar o padrão de irrupção e posicionamento dos dentes. Aliadas aos hábitos de deglutição e fonação atípicas formam a tríade responsável pela severidade do problema. As pontas ativas, grades palatinas e variações destes aparelhos são recursos terapêuticos que podem ser utilizados para adequação da língua ao seu posicionamento correto durante o repouso e a deglutição. Tendo em vista estes aspectos, o objetivo desse trabalho é discutir, a partir de uma revisão de literatura, a influência da postura anterior de língua durante o estabelecimento da mordida aberta anterior, e a indicação de recursos ortodônticos que podem ser utilizados para o tratamento dessa alteração. Pretende-se ressaltar a relevância da postura lingual, como fator etiológico da mordida aberta anterior, e sua imprescindível correção para diminuição de recorrências da anomalia.

Palavras-Chaves: Mordida Aberta. Etiologia. Terapia

Keywords: Open bite. Etiology. Therapy.

PROFILAXIA ANTIBIÓTICA NA INSTALAÇÃO DE IMPLANTES DENTAIS

ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS AT PLACEMENT OF DENTAL IMPLANTS

Mascarenhas, Leticia de Santana¹; Azoubel, Maria Cecília Fonseca².

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A reabilitação oral com implantes osseointegrados tem aumentado durante os últimos anos. Conseqüentemente, os insucessos com essa modalidade terapêutica também têm crescido. No intuito de reduzir as falhas e melhorar a utilização clínica dos implantes, alguns estudos têm sido publicados relacionando os fatores envolvidos e apontando soluções. O fator infecção é conhecidamente determinante do desfecho da maioria das reabilitações, sejam elas associadas ou não a unidades dentais e tem se mostrado importante no fracasso a curto prazo. A profilaxia antibiótica, comprovadamente, é uma alternativa de prevenção a infecções em pacientes clinicamente comprometidos ou àqueles que têm à endocardite bacteriana. Com relação aos implantes dentais isso ainda não foi estabelecido na literatura. Os ensaios clínicos randomizados publicados recentemente não apresentam um padrão metodológico, tornando difícil estabelecer uma relação entre eles e, com isto afirmar uma conduta adequada para os profissionais da área de implantodontia. Além disso, os resultados apresentados permanecem contraditórios e muitas vezes incompletos. A presente revisão visa sistematizar os dados mais recentes publicados sobre o assunto, provendo, dentro do encontrado na literatura, informações sobre a eficácia da profilaxia e caso isso seja confirmado, qual medicamento a ser utilizado a dose e o tempo de segmento adequado com base nos resultados desses estudos

Palavras-chaves: antibioticoprofilaxia; implantação dentária; prevenção de doenças.

Keywords: dental implantation; antibiotic prophylaxis; disease prevention.

PROTOCOLO CLÍNICO PARA CIMENTAÇÃO DE FACETAS LAMINADAS

CLINICAL PROTOCOL FOR CEMENTING LAMINATES VENEERS

Leão, Jade Gouvêa¹; Ticianeli, Márcio Giampá²

1. Graduanda do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

É cada vez mais frequente a procura das pessoas pela estética do sorriso, e essa busca engloba, principalmente, a forma, alinhamento e a cor dos dentes. Dentre os tratamentos odontológicos mais utilizados para se atingir o resultado estético almejado pelos pacientes, as restaurações cerâmicas ganham destaque, pois conseguem transformar sorrisos em curto espaço de tempo e, muitas vezes, com mínimo desgaste dentário. Porém, a escolha do agente cimentante correto e a técnica de cimentação utilizada são fatores de suma importância para boa durabilidade e qualidade destas reabilitações, e, cada tipo de material utilizado, possui um protocolo clínico diferente a ser seguido. Desta maneira, é imprescindível que o cirurgião-dentista possua conhecimento sobre os protocolos clínicos de cimentação adesiva para cada tipo de restauração cerâmica utilizada. O objetivo desse estudo foi, através de uma revisão de literatura, demonstrar e discutir os protocolos clínicos que devem ser aplicados para alguns tipos de facetas laminadas, na procura do enriquecimento, durabilidade e estética desse tipo de procedimento restaurador. Para isso, foram utilizados artigos científicos datados com os anos de 2006 à 2016, pesquisados através de uma busca no banco de dados do Scielo, Bireme e Pubmed, durante os anos de 2015 e 2016. Os artigos foram incluídos no trabalho através dos critérios: aplicação de facetas laminadas de porcelana com cimentação adesiva, tratamentos realizados em dentes anteriores e a apresentação de protocolo clínico.

keywords: “restoration”; “veneers”; “dental laminates”.

QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA: UM ALERTA PARA O CIRURGIÃO DENTISTA

RADIATION AND CHEMOTHERAPY: A WARNING TO THE DENTIST

Guimarães, Isabela Maria Alves¹; Vilas Boas, Maria Olímpia²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O Câncer conhecida também como é uma doença que apresenta muitas variações que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos. Entre os principais fatores de riscos estão relacionados a associação do fumo e do álcool, predisposição genética, hábitos alimentares, fatores ocupacionais, entre outros. O Câncer Oral é a quinta neoplasia mais comum no mundo e o seu tratamento provoca efeitos que proporcionam o surgimento de complicações na cavidade oral. Objetivo: Através de uma revisão de literatura baseada em dados encontrados entre os anos de 1960 e 2014 identificar as mais frequentes complicações causadas pelo tratamento de radioterapia e quimioterapia no diagnóstico de câncer na cavidade oral: infecção bucal, xerostomia, doença periodontal, cárie de radiação, osteorradionecrose. E relatar a conduta do cirurgião dentista que deve compor a equipe multiprofissional oncológica com objetivo de prevenir e tratar precocemente todas essas complicações.

Palavras-chaves: Radioterapia; Quimioterapia; Candidíase; Xerostomia; Cárie dentária; Osteorradionecrose; Mucosite.

Keywords: Radiotherapy; Drug Therapy; Candidiasis; Xerostomia; Dental Caries; Osteoradionecrosis; Mucositis

RADIOGRAFIA DIGITAL: UTOPIA OU REALIDADE?

DIGITAL RADIOGRAPHY: UTOPIA OR REALITY?

Silva, Náira Francine¹; Soares, Amanda Brandão¹; Andrade, Camila Barreto¹; Santos, João Vitor Dantas da Silva dos¹; Rios, Jacqueline Machado Gurjão²; Matos, Jane Luzia Freire²

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Introdução: A Radiografia Digital está revolucionando o conceito de aquisição de imagem na Odontologia. A imagem digital se tornou a forma mais moderna da informação radiográfica, portanto, é sabido que a radiografia digital brevemente substituirá por completo a radiografia convencional, tanto em clínicas especializadas em radiologia quanto em consultórios odontológicos. Com o intuito de informar sobre o avanço, relataremos sobre a natureza da imagem digital, os seus variados sistemas e forma de aquisição, além de suas vantagens em relação à imagem analógica. **Objetivo:** aludir aos discentes e docentes da Odontologia, conhecimento a respeito das mudanças decorrentes da introdução dos sistemas de imagem digital no mercado de trabalho. **Metodologia:** realizar uma revisão de literatura que será apresentada na forma de tema livre em slide sobre o tema específico. Serão pesquisados periódicos, artigos científicos nas bases de dados nacionais, como por exemplo LILACS e SciELO. **Conclusão:** Dessa maneira, comunicar a necessidade de compreensão dessa importante mudança na Radiologia Odontológica é um fator preponderante para o ensino aprendizagem do processo de diagnóstico das patologias maxilo-mandibulares.

Palavras- chave: Intensificação de Imagem Radiográfica. Tecnologia. Raios X. Dente.
Keywords: Radiographic Image Enhancement. Technology. X-Rays. Tooth.

RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS E NEONATAIS

RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTAL DISEASE AND COMPLICATIONS OBSTETRIC AND NEONATAL

Amaral, Débora da Silva¹; Naves, Roberta Catapano²

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A doença periodontal é uma patologia inflamatória que se inicia pela presença de placa bacteriana envolvendo as estruturas de suporte e sustentação dos dentes. Uma das patologias bucais mais prevalentes no mundo, acometendo pessoas de todas as faixas etárias e nos mais variados ciclos da vida. A sua ocorrência no período gestacional tende a ficar mais aguçada devido às alterações físicas e fisiológicas da mulher. Considera-se a gravidez o período mais susceptível para incorporação de novos hábitos, atitudes e comportamentos para instrução e motivação de higiene bucal, desenvolvidas no pré-natal por uma equipe multiprofissional, orientada por um cirurgião-dentista é de grande importância. Na literatura apresenta controvérsias metodológicas e divergência de resultados em relação ao estabelecimento da doença periodontal como fator de risco para complicações obstétricas e neonatais. O objetivo desta revisão de literatura é conhecer as repercussões da gengivite e periodontite para a gestante e para o feto, com base nas evidências científicas disponíveis na literatura.

Palavras-chaves: Doença Periodontal; Gestação; Pré-Natal; Prematuro; Baixo Peso ao Nascer.
keywords: Periodontal disease; Gestation; Prenatal; Premature; Low weight at birth.

SISTEMAS CERÂMICOS PARA LAMINADOS: INDICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS

CERAMICS SYSTEMS FOR VENEERS: INDICATIONS AND CLINICAL CONSIDERATIONS

Rocha, Rafaela Castelo Branco; Araújo, Taís Bacelar Sacramento; Lisboa, Márcio Vieira; Lima, Emilena Maria Castor Xisto

1. Discentes do curso de Graduação de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Professor adjunto do curso de Odontologia da UFBA
3. Professora adjunta do curso de Odontologia da UFBA e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

A atual demanda por padrões estéticos tem implicado em uma maior exigência e expectativa dos pacientes, fato que requer, cada vez mais, o aperfeiçoamento dos procedimentos clínicos na reabilitação oral. Assim, a busca pelo desenvolvimento de novos materiais e técnicas para uma odontologia altamente estética, adesiva e minimamente invasiva é constante, proporcionando resultados mais naturais e conservadores. Os laminados e facetas indiretas de porcelana são uma excelente alternativa para soluções estéticas em dentes anteriores, conferindo mínimo desgaste da estrutura dentária, estabilidade de cor e ótima adesão ao agente cimentante e aos substratos dentários mesmo em preparos não retentivos. Diante da diversidade de sistemas cerâmicos torna-se necessária a escolha correta do tipo de cerâmica utilizada, assim como o tratamento de superfície empregado, o qual influenciará no resultado final e longevidade do tratamento. Desta forma, este trabalho tem como objetivo revisar a literatura sobre os tipos de sistemas cerâmicos existentes atualmente no mercado e como elegê-los para a sua utilização no tratamento restaurador com laminados. O conhecimento do profissional sobre os tipos e características dos sistemas cerâmicos (ácido-sensibilidade, resistência flexural, translucidez, processo de manufatura e compatibilidade dos materiais) é fundamental para possibilitar o correto planejamento individual de cada caso, proporcionar excelência clínica do procedimento e sucesso na reabilitação prótica.

Palavras-chaves: Laminados Dentários; Porcelana Dentária; Cerâmicas.

Keywords: Dental Veneers; Dental Porcelana; Ceramics.

TRANSTORNOS ALIMENTARES E PERIMÓLISE: O CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA

EATING DISORDERS AND PERIMOLYSIS: THE SURGEON-DENTIST IN THE DIAGNOSIS OF THE DISEASE

Ramos, Thainá Andrade¹; Carvalho-Filho, Paulo Cirino de²; Xavier, Márcia Tosta³

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Os transtornos alimentares caracterizados por distúrbios psiquiátricos podem causar danos psicológicos e sociais. Tanto a anorexia nervosa quanto a bulimia podem apresentar manifestações bucais como a perimólise. A perimólise é a desmineralização do tecido dental por processos químicos ou eletrolíticos e sem o envolvimento de bactérias. Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura sobre anorexia nervosa e bulimia relacionadas à perimólise, alertando o cirurgião-dentista para o diagnóstico precoce da doença. Foram pesquisadas as bases eletrônicas PubMed, BIREME e SciELO, buscando estudos publicados entre 2005 e 2016, usando em português, inglês e espanhol os descritores: “Erosão Dentária”, “Perimólise”, “Transtornos Alimentares” e “Bulimia”. Foram encontrados 258 artigos e 35 foram incluídos. O perfil desses pacientes revela baixa autoestima, insegurança, depressão, culpa e sentimento de vergonha. A prática da regurgitação é mantida em segredo, provocando problemas dentais como a perimólise, resultado da ação do ácido gástrico que entra em contato com os dentes causando a desmineralização e dissolução do esmalte. Os fatores associados com a ocorrência e a severidade da erosão dentária são o tempo de duração da doença e a frequência dos episódios de vômito. Pode-se concluir que as etiologias da perimólise são relativamente frequentes na população. Clinicamente, as características e localizações da erosão justificam a origem ácida. Assim, o cirurgião-dentista deve estar apto a diagnosticá-las e, através de uma abordagem multiprofissional, estimular a procura de profissionais especializados, reduzindo as consequências destes transtornos.

Palavras-chave: Erosão Dentária; Transtornos Alimentares; Bulimia; Manifestações Oraís
Keywords: Dental Erosion; Eating Disorders; Bulimia; Oral Manifestations

TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR: REVISÃO DE LITERATURA

DENTOALVEOLAR TRAUMA: LITERATURE REVIEW

Santos, Jéssica Cruz dos¹; Garcia, Carolina Silva Cervinõ¹; Almeida, Tatiana Frederico de²

1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O traumatismo dentoalveolar tem como definição qualquer injúria de natureza, química, física ou térmica causada sobre o dente, às estruturas de suporte e aos tecidos moles adjacentes. As lesões traumáticas dentárias podem ir desde uma fratura simples em esmalte até a uma avulsão da loja alveolar. Por ser o traumatismo dentário mais prevalente, as fraturas coronárias são as lesões mais tratadas pelo cirurgião-dentista. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre o traumatismo dentoalveolar, fatores etiológicos, principais dentes acometidos e faixa etária envolvida, além das possíveis formas de tratamento. Como metodologia foi realizada uma revisão de literatura a cerca do traumatismo dentoalveolar utilizando os termos: Traumatismo dentoalveolar, Crianças e Adolescentes nas bases de dados Scielo, Pubmed e Periódicos Capes. O traumatismo dentoalveolar por possuir maior ocorrência em crianças e adolescentes, apresenta uma etiologia de caráter multifatorial, envolvendo quedas, esportes radicais e acidentes automobilísticos, mais associados ao gênero masculino. A literatura apresenta que a maxila está mais envolvida do que a mandíbula e os incisivos centrais superiores são os dentes mais acometidos devido a sua posição vulnerável na arcada dentária. As formas de tratamentos mais utilizadas incluem as restaurações adesivas exclusivamente, ou associada a tratamento endodôntico, coroa unitária, colagem do fragmento, aparelho ortodôntico e prótese móvel. O traumatismo dentário é um fator que influencia na qualidade de vida da criança envolvendo danos estéticos, psicológicos e sociais, sendo fundamental elaborar medidas de promoção e prevenção, ressaltando que o tratamento imediato é essencial para um bom prognóstico.

Palavras-chaves: traumatismo dentário, criança, adolescente.

Keywords: *traumatic dental injury, child, adolescent.*

TUMOR ODONTOGÊNICO CERATOCÍSTICO EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO

TUMOR ODONTOGENIC KERATOCYSTIC IN JAW: CASE REPORT

Santos, Rodrigo Araújo¹; Sousa-Filho, Francisnei Santos¹; Rocha, Matheus de Souza¹; Brito, Jones Heberte Nascimento¹; Vasconcelos, Gabriel Queiroz²; Maciel, Anderson da Silva³.

1 – União Metropolitana para Desenvolvimento da Educação e Cultura, campus Lauro de Freitas.

2 – Mestre em Diagnóstico bucal pela Universidade Federal da Bahia

3- Mestre em Diagnóstico bucal pela Universidade Federal da Bahia / Docente do Núcleo de Propedêuticas Clínicas e Cirúrgicas da União Metropolitana para Desenvolvimento da Educação e Cultura, campus Lauro de Freitas.

O tumor odontogênico ceratocístico é considerado uma neoplasia cística benigna, segundo a OMS. Possui leve prevalência em homens sendo encontrado em pacientes com idade variável, cerca de 60% entre 10 e 40 anos. Acomete a mandíbula em 60% a 80% dos casos, sendo mais frequentemente encontrado na região de corpo e ramo. O início da lesão tem etiologia desconhecida, no entanto é aceito que surgem a partir dos restos celulares da lâmina dental e seu crescimento se deve a características inerentes ao próprio epitélio cístico ou à atividade enzimática na parede cística. Clinicamente apresenta crescimento em direção ântero-posterior, logo não produz expansão óssea, característica útil ao diagnóstico diferencial, pois cistos dentígeros e radiculares de tamanho comparável associam-se à expansão. Radiograficamente exibem área radiolúcida, com margens escleróticas frequentemente bem definidas e, lesões grandes, podem se apresentar multiloculadas. O diagnóstico baseia-se nas características histopatológicas, já que o ceratocisto odontogênico apresenta características clínicas similares a diversas lesão do sistema estomatognático. O tratamento é feito através de enucleação e curetagem, no entanto apresenta altas taxas de recidivas, diferentemente de outros cistos odontogênicos, variando de 5% a 62%, a fim de minimizar esse risco, técnicas cirúrgicas complementares como a osteotomia periférica, cauterização química com solução de Carnoy ou crioterapia da cavidade óssea após a remoção do cisto são recomendadas para reduzir a frequência de recorrências. O objetivo deste trabalho é de relatar um caso de um paciente diagnosticado com tumor odontogênico ceratocístico acometido em mandíbula, e seu tratamento por enucleação e curetagem associado à crioterapia.

Palavras-chave: Tumores Odontogênicos, Mandíbula, Terapêutica.

Keywords: Odontogenic Tumors, Mandible, Therapeutics.

USO DA PLACA DE AVANÇO MANDIBULAR PARA A SINDROME DA APNEIA E HIPOPNÉIA DO SONO PODE DESENVOLVER DISTÚRBIOS TEMPOROMANBIDULARES?

DOES THE ORAL APPLIANCE USING FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA CAN DEVELOP TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS?

Novais, Fabiana de Jesus¹; Brandão, Janefy Rio^{1s}; Santos, Bethânia da Silva¹; Andrade, Adriana²

1.Alunas do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana-Ba

2.Professora Adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana-Ba

A síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do sono (SAHOS) é um transtorno respiratório ocasionado pelo estreitamento das vias aéreas superiores durante o sono. É comumente acompanhada por ronco. Em casos graves, podem relacionar-se a doenças importantes como cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, hipertensão, entre outras co-morbidades. Para muitos desses pacientes, a placa de avanço mandibular (PAM) é uma valiosa alternativa de tratamento. O objetivo desse trabalho é o de discutir se a placa de avanço mandibular utilizada para SAHOS é capaz de provocar alterações no Sistema Temporomandibular (DTM) e se, em caso de disfunção pré-existente, esse tipo de tratamento deva ser contraindicado. Os distúrbios do Sono impactam sobre a qualidade de vida dos pacientes e são prevalentes em portadores de dor crônica (Sommer et.al.,2015). A terapia com PAM propicia a protusão mandibular afim de, aumentar o espaço aéreo posterior permitindo uma melhor passagem do ar (Inoko & Morita,2009). A manutenção da mandíbula em uma posição não habitual, durante o sono, potencialmente afetaria a harmonia do sistema estomatognático com um possível desenvolvimento de DTM (Perez et. al., 2012). Embora existam poucos relatos em literatura que associem o uso da PAM com alterações Temporomandibulares acredita-se que pacientes sem sintomatologia prévia podem apresentar desconfortos articulares transitórios no início do tratamento. Entretanto, naqueles com sinais pré-existentes de DTM parece não ocorrer exacerbação desse quadro durante a fase inicial, enquanto que, a longo prazo de utilização da placa de avanço mandibular verifica-se uma diminuição dos sintomas.

Palavras-Chaves: Apneia do Sono Tipo Obstrutiva, avanço mandibular, Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular

Keywords: Obstructive sleep apnea, Mandibular Advancement, Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome